


ENTERAALSETE RAVITOITUDE JA TOITMISTARVIKUTE KATALOOG

Informatsioon ainult meditsiinitöötajatele

NutriMedical OÜ
Türi 3, 11313 Tallinn
E-mail: info@nutrimedical.ee
www.nutricia.ee



Nutrison	3
Nutrison Multi Fibre	4
Nutrison Energy	5
Nutrison Energy Multi Fibre	6
Nutrison 1000 Complete Multi Fibre	7
Nutrison advanced Cubison	8
Nutrison advanced Diason	9
Nutrison Diason Energy HP	10
Nutrison advanced Peptisorb	11
Nutrison Protein Plus	12
Nutrison Protein Advance	13
Nutrison Protein Intense	14
Nutridrink	15
Nutridrink Protein	16
Nutridrink Protein Omega 3	17
Nutridrink PlantBased	18
Nutridrink Multi Fibre	19
Nutridrink Juice Style	20
Diasip	21
Cubitan	22
Renilon 4.0	23
Renilon 7.5	24
preOp	25
Calogen	26
Nutrison pulber	27
Protifar	28
Fantomalt	29
Nuttilis pulber	30
Nuttilis Clear	31

Infatrini	32
Infatrini Peptisorb	33
Nutrini	34
Nutrini Multi Fibre	35
Nutrini Energy Multi Fibre	36
Nutrini Peptisorb	37
NutriKid Multi Fibre	38
Neocate Syneo	39
Neocate LCP	40
Neocate Junior	41
KetoCal 4:1	42
KetoCal 3:1 neutral	43
Liquigen	44
Flocare® Infinity™ enteraalse toitmise pump	45
Flocare® toitmissüsteem pudelile gravitatsioonimeetodil toitmiseks - ENFit	46
Flocare® toitmissüsteem spike otsikuga gravitatsioonimeetodil toitmiseks - ENFit	47
Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbaga toitmiseks pudelist - ENFit	48
Flocare® Infinity™ toitmissüsteem spike otsikuga pumbaga toitmiseks - ENFit	49
Flocare® PEG Set - ENFit	50
Flocare® PEG otsik - ENFit	51
Flocare® Infinity™ toitmissüsteem 1,3 L reservuaariga toitmiseks toitmispumbaga	52
Flocare® balloongastrostoom	53
Flocare® PUR toitmissond - ENFit	54
Flocare® pikendusliin, 100 cm	55
ENFit lahusekõrs, 100 mm	56
Madalaprofiilne balloongastrostoom (nööp)	57
Flocare® balloongastrostoomi pikendusliin (toitmissüsteem)	58
Flocare® ENFit enteraalsed toitmissüstlad	59
Flocare® boolusadapter	60
Flocare® ENFit kahe spikega vaheühendus	61



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 49%, rasvadest 35%
- **P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin (lehmapiimast), soja ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

Kasutamisenäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	420 kJ/100 kcal
Rasvad (35 E%)	3,9 g
millest:	
küllastunud rh	1,0 g
monoküllastumata rh	2,2 g
polüküllastumata rh	0,7 g
dokosaheksaeenhape (DHA)	13,6 mg
eikosapentaenehape (EPA)	20,0 mg
Süsivesikud (49 E%)	12,3 g
millest:	
suhkrud	0,7 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	<0,1 g
Valgud (16 E%)	4,0 g
Sool	0,25 g

Muud	
Karotenoidid	0,20 mg
Koliin	37 mg
Osmolaarsus	255 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	85 ml

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D ₃	1,0 µg
E	1,3 mg α-TE/ET
K	5,3 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,8 mg NE/EN
Pantoteenhape	0,53 mg
B ₆	0,17 mg
Foolhape	27 µg
B ₁₂	0,21 µg
Biotiin	4,0 µg
C	10 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	150 mg
Cl	125 mg
Ca	80 mg
P	72 mg
PO ₄	221 mg
Mg	23 mg
Fe	1,6 mg
Zn	1,2 mg
Cu	0,18 mg
Mn	0,33 mg
F	0,10 mg
Mo	10 µg
Se	5,7 µg
Cr	6,7 µg
I	13 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml, 1000 ml plastpudel



NUTRICIA

Nutrison Multi Fibre

1,0 kcal/ml

Standardne toitelahus kiudainetega



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiasisaldus – 1,03 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 47%, rasvadest 34%, kiudainetest 3%
- **P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin (lehmapiimast), soja ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita


Kasutamisinäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaallergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	430 kJ/103 kcal
Rasvad (34 E%)	3,9 g
millest:	
küllastunud rh	1,0 g
monoküllastumata rh	2,2 g
polüküllastumata rh	0,7 g
dokosaheksaehape (DHA)	13,6 mg
eikosapentaehape (EPA)	20,0 mg
Süsivesikud (47 E%)	12,3 g
millest:	
suhkrud	0,8 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (3 E%)	1,5 g
Valgud (16 E%)	4,0 g
Sool	0,25 g

Muud	
Karotenoidid	0,20 mg
Koliin	37 mg
Osmolaarsus	250 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	83 ml

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D ₃	1,0 µg
E	1,3 mg α-TE
K	5,3 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,53 mg
B ₆	0,17 mg
Foolhape	27 µg
B ₁₂	0,21 µg
Biotiin	4,0 µg
C	10 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	150 mg
Cl	125 mg
Ca	80 mg
P	72 mg
PO ₄	221 mg
Mg	23 mg
Fe	1,6 mg
Zn	1,2 mg
Cu	180 µg
Mn	0,33 mg
F	0,10 mg
Mo	10 µg
Se	5,7 µg
Cr	6,7 µg
I	13 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml, 1000 ml plastpudel



NUTRICIA

Nutrison Energy

1,5 kcal/ml

Energiarikas toitelahus



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,5 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 49%, rasvadest 35%
- **P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin (lehmapiimast), soja ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

Kasutamisläbiviisid

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaallergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumistalade teave 100 ml tootes

Energia	630 kJ/150 kcal
Rasvad (35 E%)	5,8 g
millest:	
küllastunud rh	1,5 g
monoküllastumata rh	3,2 g
polüküllastumata rh	1,1 g
dokosaheksaehape (DHA)	14,3 mg
eikosapentaehape (EPA)	19,7 mg
Süsivesikud (49 E%)	18,3 g
millest:	
suhkrud	1,1 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	<0,1 g
Valgud (16 E%)	6,0 g
Sool	0,34 g

Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	55 mg
Osmolaarsus	360 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	78 ml

Vitamiinid	
A	123 µg RE
D ₃	1,5 µg
E	1,9 mg α-TE
K	8,0 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	2,7 mg NE
Pantoteenhape	0,80 mg
B ₆	0,26 mg
Foolhape	40 µg
B ₁₂	0,32 µg
Biotiin	6,0 µg
C	15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	134 mg
K	201 mg
Cl	100 mg
Ca	108 mg
P	108 mg
PO ₄	331 mg
Mg	34 mg
Fe	2,4 mg
Zn	1,8 mg
Cu	270 µg
Mn	0,50 mg
F	0,15 mg
Mo	15 µg
Se	8,6 µg
Cr	10 µg
I	20 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1000 - 1500 ml päevas
1000 ml = 1500 kcal, mis katab 100% mineraalainete ja vitamiinide vajaduse

Pakend: 500 ml, 1000 ml plastpudel



Nutrison Energy Multi Fibre

1,5 kcal/ml

Energiarikas toitelahus kiudainetega



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiselvalmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,53 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 48%, rasvadest 34%, kiudainetest 2%
- P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin (lehmapiimast), soja ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita


Kasutamisinäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	640 kJ/153 kcal
Rasvad (34 E%)	5,8 g
millest:	
küllastunud rh	1,5 g
monoküllastumata rh	3,3 g
polüküllastumata rh	1,1 g
dokosaheksaehenhape (DHA)	13,7 mg
eikosapentaehenhape (EPA)	20,0 mg
Süsivesikud (48 E%)	18,4 g
millest:	
suhkrud	2,4 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (16 E%)	6,0 g
Sool	0,33 g

Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	55 mg
Osmolaarsus	390 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	76 ml

Vitamiinid	
A	123 µg RE
D ₃	1,5 µg
E	1,9 mg α-TE
K	8,0 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	2,7 mg NE
Pantoteenhape	0,80 mg
B ₆	0,26 mg
Foolhape	40 µg
B ₁₂	0,32 µg
Biotiin	6,0 µg
C	15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	134 mg
K	201 mg
Cl	100 mg
Ca	84 mg
P	84 mg
Mg	30 mg
Fe	2,4 mg
Zn	1,8 mg
Cu	270 µg
Mn	0,50 mg
F	0,15 mg
Mo	15 µg
Se	8,6 µg
Cr	10 µg
I	20 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1000 - 1500 ml päevas
1000 ml = 1500 kcal, mis katab 100% mineraalainete ja vitamiinide vajaduse

Pakend: 500 ml, 1000 ml plastpudel



Nutrison 1000 Complete Multi Fibre 1,0 kcal/ml



Vitamiinide- ja mineraalaineterikas toitelahus kiudainetega

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,04 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 21%, süsivesikutest 43%, rasvadest 32%, kiudainetest 4%
- **P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin (lehmapiimast), soja ja hernevalk (mis tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Üks liiter toodet sisaldab vajaliku päevase koguse valke, vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisanäidustused

Kasutatakse madala energiavajadusega või rasvunud patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Pea ja/või seljaaju traumad
- Kaasasündinud väärarengud
- KNS häired
- Kooma
- Ajuinfarkt (insult)
- Parkinsoni tõbi
- Sclerosis multiplex
- Alzheimeri tõbi
- Dementsus

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	440 kJ/104 kcal
Rasvad (32 E%)	3,7 g
millest:	
küllastunud rh	1,0 g
monoküllastumata rh	2,0 g
polüküllastumata rh	0,7 g
dokosaheksaehape (DHA)	20,3 mg
eikosapentaehape (EPA)	30,0 mg
Süsivesikud (43 E%)	11,3 g
millest:	
suhkrud	0,8 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (4 E%)	2,0 g
Valgud (21 E%)	5,5 g
Sool	0,38 g

Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	55 mg
Osmolaarsus	325 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	82 ml

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 12 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1000 ml päevas
NB! Ainulaadne toode, mille 1000 ml katab 100% päevasest vitamiinide ja mineraalainete vajadusest

Pakend: 1000 ml plastpudel

Vitamiinid	
A	123 µg RE
D ₃	2,0 µg
E	1,9 mg α-TE
K	8,0 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	2,7 mg NE
Pantoteenhape	0,8 mg
B ₆	0,26 mg
Foolhape	40 µg
B ₁₂	0,32 µg
Biotiin	6,0 µg
C	15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	150 mg
K	225 mg
Cl	145 mg
Ca	120 mg
P	96 mg
Mg	27 mg
Fe	2,4 mg
Zn	1,8 mg
Cu	270 µg
Mn	0,50 mg
F	0,15 mg
Mo	15 µg
Se	8,5 µg
Cr	10 µg
I	20 µg



NUTRICIA
Nutrison advanced
Cubison
1,0 kcal/ml

Arginiini-, mikroelementide- ja antioksidantide rikas toitelaus
kiudainetega



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelaus
- Energiasisaldus – 1,04 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 22%, süsivesikutest 47%, rasvadest 28%, kiudainetest 3%
- Valgurikas (kaseiin) – 5,5 g/100 ml, arginiini sisaldus (8,5 g/1000 ml) ja suurem kogus antioksidante (karotenoide, vitamiin C ja E, tsink), mis on vajalik haavade paranemiseks
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Süsivesikute allikas - maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisenäidustused

Patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ning kellel on lisatoitainete vajadus lamatiste või haavade tõttu

- Lamatised
- Põletused
- Operatsioonihäavad
- Traumade järgsed haavad

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainete piiranguga dieedi korral
- Ei sobi kriitilises seisundis haigetele



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	435 kJ/104 kcal
Rasvad (28 E%)	3,3 g
millest:	
küllastunud rh	1,2 g
MCT	0,9 g
monoküllastumata rh	1,4 g
polüküllastumata rh	0,7 g
Süsivesikud (47 E%)	12,5 g
millest:	
suhkrud	1,0 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (3 E%)	1,5 g
Valgud (22 E%)	5,5 g
Sool	0,25 g

Muud	
L-karnitiin	0,85 g
Karotenoidid	0,23 mg
Koliin	37 mg
Osmolaarsus	315 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	83 ml

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D ₃	0,70 µg
E	7,5 mg α-TE
K	5,3 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,19 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,53 mg
B ₆	0,20 mg
Foolhape	30 µg
B ₁₂	0,24 µg
Biotiin	4,0 µg
C	38 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	150 mg
Cl	125 mg
Ca	80 mg
P	72 mg
Mg	23 mg
Fe	1,6 mg
Zn	2,0 mg
Cu	200 µg
Mn	0,38 mg
F	0,10 mg
Mo	10 µg
Se	9,6 µg
Cr	6,7 µg
I	13 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1-12 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1000 - 2000 ml päevas

Pakend: 1000 ml plastpudel



Nutrison advanced Diason

1,0 kcal/ml

Sojavalgul baseeruv toitelahus kiudainetega



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiasisaldus - 1,03 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 17%, süsivesikutest 43%, rasvadest 37%, kiudainetest 3%
- Valguallikas – sojavalgu isolaat
- Madala süsivesikute sisaldus. Süsivesikutena tärklis ja fruktoos
- Monoküllastumata rasvhapete rikas
- Antioksidantide rikas (C- ja E- vitamiin, seleen)
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu MF6
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisinäidustused

Patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine

- Diabeet ja hüperglükeemia
- Glükoositalumatus raskete traumade/vigastuste järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi lastele alla 1 aastat
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi fruktoosemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	435 kJ/103 kcal
Rasvad (37 E%)	4,2 g
millest:	
küllastunud rh	0,5 g
monoküllastumata rh	3,0 g
polüküllastumata rh	0,7 g
Süsivesikud (44 E%)	11,3 g
millest:	
suhkrud	2,3 g
laktoos	<0,006 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (17 E%)	4,3 g
Sool	0,25 g

Muud	
Karotenoidid	0,20 mg
Koliin	37 mg
Osmolaarsus	300 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	84 ml

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D ₃	0,70 µg
E	2,5 mg α-TE
K	5,3 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,53 mg
B ₆	0,17 mg
Foolhape	38 µg
B ₁₂	0,50 µg
Biotiin	4,0 µg
C	15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	150 mg
Cl	125 mg
Ca	80 mg
P	72 mg
Mg	23 mg
Fe	1,6 mg
Zn	1,2 mg
Cu	180 µg
Mn	0,33 mg
F	0,10 mg
Mo	10 µg
Se	7,5 µg
Cr	12 µg
I	13 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel



Nutrison Diason Energy HP

1,5 kcal/ml

Energia- ja valgurikas toitelahus kiudainetega



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Kõrge energiasisaldus – 1,5 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 21%, süsivesikutest 31%, rasvadest 46%, kiudainetest 2%
- Valgurikas (7,7 g/100 ml), valguallikas – kaseinaat piimast ja osaliselt hüdrolüüsitud sojavalg
- Jälgida ja reguleerida vedelikutasakaalu
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu MF6
- Gluteeni- ja laktoosita

Kasutamisenäidustused

Patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine

- Diabeet ja hüperglükeemia
- Glükoositalumatus raskete traumade/vigastuste järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi lastele alla 12 aasta vanustele lastele
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	625 kJ/150 kcal
Rasvad (46 E%)	7,7 g
millest:	
küllastunud rh	0,8 g
monoküllastumata rh	4,6 g
polüküllastumata rh	2,3 g
dokosaheksaenehape (DHA)	20 mg
eikosapentaenehape (EPA)	29,9 mg
Süsivesikud (31 E%)	11,7 g
millest:	
suhkrud	4,5 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (21 E%)	7,7 g
Sool	0,33 g

Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	53 mg
Osmolaarsus	395 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	77 ml

Vitamiinid	
A	119 µg RE
D ₃	1,0 µg
E	3,6 mg α-TE
K	7,7 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	2,6 mg NE
Pantoteenhape	0,77 mg
B ₆	0,24 mg
Foolhape	42 µg
B ₁₂	0,72 µg
Biotiin	5,8 µg
C	22 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	131 mg
K	200 mg
Cl	98 mg
Ca	82 mg
P	82 mg
Mg	37 mg
Fe	1,9 mg
Zn	1,4 mg
Cu	210 µg
Mn	0,38 mg
F	0,12 mg
Mo	12 µg
Se	8,7 µg
Cr	14 µg
I	16 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses üle 12 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1000 - 2000 ml päevas
1000 ml = 1500 kcal, mis katab 100% mineraalainete ja vitamiinide vajaduse

Pakend: 500 ml, 1000 ml plastpudel



Nutrison advanced Peptisorb

1,0 kcal/ml

Lõhustatud valguga ja madala rasvasisaldusega toitelahus

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiasisaldus 1 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 69%, rasvadest 15%
- Valguallikas – peptiidid
- Madala rasvasisaldusega
- 47% rasvast kergesti imenduv MCT õli (keskmise ahelaga triglütseriidid)
- Süsivesikute allikas - maltodekstriin
- Kiudaineteta, laktoosita ja gluteenita

Kasutamiskõhustused

Kasutatakse raskete seedimis- ja imendumishäiretega patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Äge pankreatiit
- Soole resektsioon
- Mittespetsiifilised soolepõletikud
- Ravile allumatu malabsorptsioon
- Lühikese soole sündroom
- Toitmine peensoole

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	423 kJ/100 kcal
Rasvad (15 E%)	1,7 g
millest:	
küllastunud rh	1 g
MCT	0,8 g
monoküllastumata rh	0,2 g
polüküllastumata rh	0,5 g
Süsivesikud (69 E%)	17,7 g
millest:	
suhkrud	1,7 g
laktoos	0,1 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (16 E%)	4,0 g
Sool	0,25 g

Muud	
Karotenoidid	0,16 mg
Koliin	36,7 mg
Tauriin	10 mg
Osmolaarsus	455 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	84 ml

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D ₃	0,70 µg
E	1,25 mg α-TE
K	5,3 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,53 mg
B ₆	0,17 mg
Foolhape	27 µg
B ₁₂	0,39 µg
Biotiin	4,0 µg
C	10 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	150 mg
Cl	133 mg
Ca	80,1 mg
P	70 mg
Mg	23 mg
Fe	1,58 mg
Zn	1,16 mg
Cu	180 µg
Mn	0,33 mg
F	0,10 mg
Mo	11 µg
Se	5,7 µg
Cr	6,7 µg
I	13 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel



Nutrison Protein Plus

1,25 kcal/ml

Optimaalse energiasaldusega valgurikas toitelahus



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energia – 1,25 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 20%, süsivesikutest 45%, rasvadest 35%
- Kõrgem valgusisaldus, 63 g/1000 ml, oluline kriitilises seisundis patsientidele
- **P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin, soja- ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Kiudaineteta, laktoosita ja gluteenita

Kasutamisinäidustused

Kasutatakse suurema energia ja valguvajadusega patsientide toitmiseks enteraalset (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Operatsioonijärgses perioodis väljendunud hüperkataboolse seisundi korral
- Hulgitrauma
- Onkoloogilised haiged
- Rasked infektsioonid
- Põletused
- Hingamis- või südamepuudulikkus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	525 kJ/125 kcal
Rasvad (35 E%)	4,9 g
millest:	
küllastunud rh	1,3 g
MCT	0,7 g
monoküllastumata rh	2,7 g
polüküllastumata rh	0,9 g
dokosaheksaenenhape (DHA)	20,4 mg
eikosapentaenenhape (EPA)	30,0 mg
Süsivesikud (45 E%)	14,2 g
millest:	
suhkrud	0,9 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	<0,1 g
Valgud (20 E%)	6,3 g
Sool	0,28 g

Muud	
Karotenoidid	0,25 mg
Koliin	46 mg
Osmolaarsus	275 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	81 ml

Vitamiinid	
A	102 µg RE
D ₃	1,7 µg
E	1,6 mg α-TE
K	6,6 µg
Tiamiin	0,19 mg
Riboflaviin	0,20 mg
Niatsiin	2,3 mg NE
Pantoteenhape	0,66 mg
B ₆	0,21 mg
Foolhape	33 µg
B ₁₂	0,26 µg
Biotiin	5,0 µg
C	13 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	111 mg
K	168 mg
Cl	80 mg
Ca	90 mg
P	90 mg
PO ₄	276 mg
Mg	28 mg
Fe	2,0 mg
Zn	1,5 mg
Cu	230 µg
Mn	0,41 mg
F	0,13 mg
Mo	13 µg
Se	7,1 µg
Cr	8,3 µg
I	17 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 1000 ml plastpudel



Nutrison Protein Advance

1,28 kcal/ml



Optimaalse energiasaldusega valgurikas kiudainetega toitelahus

Toote iseloomustus

- Täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Suurem energiasaldus – 1,28 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 24%, süsivesikutest 48%, rasvadest 26%, kiudainetest 2%
- Valgurikas 7,5 g/100 ml (vajalik väljendunud metaboolse stressi korral)
- P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin, soja- ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Sisaldab lahustuvate ja lahustumatute kiudained segu – **MF6** (6 erinevat kiudainet)
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisanõidustused

Kasutatakse metaboolses stressis patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Kriitiliselt haiged patsiendid
- Operatsioonijärgne periood väljendunud hüperkatabolismiga
- Onkoloogilised haiged
- Hulgitraumad
- Rasked infektsioonid
- Põletused

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	540 kJ/128 kcal
Rasvad (26 E%)	3,7 g
millest:	
küllastunud rh	1,0 g
MCT	0,5 g
monoküllastumata rh	2,0 g
polüküllastumata rh	0,7 g
dokosaheksaenenhape (DHA)	20,4 mg
eikosapentaenenhape (EPA)	30,0 mg
Süsivesikud (48 E%)	15,4 g
millest:	
suhkrud	1,0 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (24 E%)	7,5 g
Sool	0,2 g

Muud	
Karotenoidid	0,25 mg
Koliin	46 mg
Osmolaarsus	270 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	79 ml

Vitamiinid	
A	95 µg RE
D ₃	1,7 µg
E	1,5 mg α-TE
K	6,1 µg
Tiamiin	0,19 mg
Riboflaviin	0,20 mg
Niatsiin	2,3 mg NE
Pantoteenhape	0,66 mg
B ₆	0,21 mg
Foolhape	33 µg
B ₁₂	0,30 µg
Biotiin	5,0 µg
C	13 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	81 mg
K	150 mg
Cl	80 mg
Ca	112 mg
P	91 mg
Mg	22 mg
Fe	2,0 mg
Zn	1,5 mg
Cu	230 µg
Mn	0,41 mg
F	0,13 mg
Mo	13 µg
Se	7,5 µg
Cr	8,3 µg
I	17 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel



Nutrison Protein Intense

1,26 kcal/ml

Optimaalse energiasaldusega väga kõrge valgusisaldusega toitelahus



Toote iseloomustus

- Täisväärtuslik kasutamismisvalmis toitelahus
- Suurem energiasisaldus – 1,26 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 32%, süsivesikutest 33%, rasvadest 35%
- Valgurikas 10 g/100 ml (vajalik vältimiseks metaboolse stressi korral)
- P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk, kaseiin, soja- ja hernevalk (tagavad mao kiire tühenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

Kasutamisläbikäik

Kasutatakse metaboolse stressi patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Kriitiliselt haiged patsiendid
- Operatsioonijärgne periood vältimiseks hüperkatabolismiga
- Onkoloogilised haiged
- Hulgitraumad
- Rasked infektsioonid
- Põletused

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks



Toitumistalane teave 100 ml tootes

Energia	528 kJ/126 kcal
Rasvad (35 E%)	4,9 g
millest: küllastunud rh	1,3 g
Süsivesikud (33 E%)	10,4 g
millest:	
suhkrud	0,8 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	0,09 g
Valgud (32 E%)	10 g
Sool	0,29 g

Muud	
Karotenoidid	0,20 mg
Koliin	46 mg
Osmolaarsus	275 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	102 µg RE
D ₃	1,72 µg
E	1,63 mg α-TE
K	6,6 µg
Tiamiin	0,19 mg
Riboflaviin	0,29 mg
Niatsiin	2,31 mg NE
Pantoteenhape	0,66 mg
B ₆	0,21 mg
Foolhape	33,1 µg
B ₁₂	0,52 µg
Biotiin	5,0 µg
C	13,3 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	116 mg
K	218 mg
Cl	96,4 mg
Ca	75 mg
P	81,9 mg
Mg	22 mg
Fe	2,0 mg
Zn	1,45 mg
Cu	220 µg
Mn	0,35 mg
F	0,13 mg
Mo	13 µg
Se	6,83 µg
Cr	8,3 µg
I	18,9 µg

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Doseerimine: 1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 49%, rasvadest 35%
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi <0,5 g
- Kiudaineteta
- Gluteenita

Kasutamisinäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivselt
- Pea- ja kaelakirurgia järgselt
- Tsüstiline fibroos

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamismisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Nutridrink® vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	1010 kJ/240 kcal
Rasvad (35 E%)	9,3 g
millest: küllastunud rh	0,86 g
Süsivesikud (49 E%)	29,6 g
millest:	
suhkrud	15,5 g
laktoos	<0,5 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (16 E%)	9,6 g
Sool	0,24 g

Muud	
Koliin	88,1 mg
Osmolaarsus	790 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	240 µg RE
D ₃	1,8 µg
E	3,0 mg α-TE
K	13 µg
Tiamiin	0,40 mg
Riboflaviin	0,40 mg
Niatsiin	4,3 mg NE
Pantoteenhape	1,3 mg
B ₆	0,40 mg
Foolhape	64 µg
B ₁₂	0,70 µg
Biotiin	9,6 µg
C	24 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	96 mg
K	237 mg
Cl	85 mg
Ca	176 mg
P	182 mg
Mg	32,5 mg
Fe	3,85 mg
Zn	2,9 mg
Cu	0,43 mg
Mn	0,84 mg
F	0,18 mg
Mo	24 µg
Se	14,7 µg
Cr	16 µg
I	36,3 µg

Doseerimine

Ainsa toiduna päevas: 5 - 7 pudelit
Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit
V.a.juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti
Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitset: neutraalne, vanilje, šokolaad, maasikas





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 24%, süsivesikutest 41%, rasvadest 35%
- Energiatühi: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi – 0,3 g
- Kiudaineteta
- Gluteenita

Kasutamisinäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine, onkoloogilised haiged.

- Kiiritusravi korral
- Keemiaravi korral
- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Isutus

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi kasutamiseks ainsa toiduna päevas, tagada piisav lisavedelik
- Vanuses 6 - 10 aastat tarbida ettevaatlikult

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Nutridrink® Protein vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	1029 kJ/245 kcal
Rasvad (35 E%)	9,6 g
millest: küllastunud rh	0,86 g
Süsivesikud (44 E%)	25,1 g
millest:	
suhkrud	13,7 g
laktoos	<0,35 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (24 E%)	14,6 g
Sool	0,09 g

Muud	
Koliin	99,4 mg
Osmolaarsus	570 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	260 µg RE
D ₃	2,08 µg
E	4,9 mg α-TE
K	18,9 µg
Tiamiin	0,52 mg
Riboflaviin	0,56 mg
Niatsiin	4,12 mg NE
Pantoteenhape	1,53 mg
B ₆	0,61 mg
Foolhape	80,9 µg
B ₁₂	0,9 µg
Biotiin	10,1 µg
C	30,7 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	35 mg
K	97,6 mg
Cl	60 mg
Ca	350 mg
P	282 mg
Mg	54 mg
Fe	2,19 mg
Zn	2,58 mg
Cu	350 mg
Mn	0,64 mg
F	0,18 mg
Mo	21,5 µg
Se	15,4 µg
Cr	13 µg
I	49 µg

Doseerimine

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti
Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva

Pakend: 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

Maitsetd: mokka, vanilje, maasikas, marjad, virsik-mango ning neutraalne, jahutavad punased marjad



Nutridrink Protein Omega 3



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 24 E%, süsivesikutest 41 E%, rasvadest 35 E%
- Sisaldab EPA-t 880 mg/100 ml ja DHA-d 585 mg/100 ml
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi <0,35 g/100 ml
- Kiudaineteta
- Gluteenita

Kasutamisinidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine, onkoloogilised haiged.

- Kiiritus- ja keemiaravi ettevalmistusperioodis
- Kiiritus- ja keemiaravi ajal ja pärast seda
- Perioperatiivselt
- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Isutus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi kasutamiseks ainsa toiduna päevas, tagada piisav lisavedelik
- Vanuses 6 - 10 aastat tarbida ettevaatlikult



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Nutridrink® Protein Omega 3 jahutavate marjade näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	1029 kJ/245 kcal
Rasvad (35 E%)	9,6 g
millest: küllastunud rh	2,2 g
polüküllastumata rh	3,5 g
eikosapentaenehape (EPA)	880 mg
dokosaheksaenehape (DHA)	585 mg
Süsivesikud (41 E%)	25,1 g
millest:	
suhkrud	13,4 g
laktoos	<0,35 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (24 E%)	14,6 g
Sool	0,1 g

Muud	
Koliin	99 mg
Osmolaarsus	570 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	232 µg RE
D ₃	7,85 µg
E	4,09 mg α-TE
K	14,0 µg
Tiamiin	0,24 mg
Riboflaviin	0,50 mg
Niatsiin	4,23 mg NE
Pantoteenhape	1,55 mg
B ₆	0,51 mg
Foolhape	35,4 µg
B ₁₂	1,04 µg
Biotiin	10,6 µg
C	31,4 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	39,1 mg
K	98,0 mg
Cl	46,8 mg
Ca	336 mg
P	287 mg
Mg	54,0 mg
Fe	2,37 mg
Zn	2,30 mg
Cu	340 µg
Mn	0,24 mg
F	0,25 mg
Mo	14,7 µg
Se	13,4 µg
Cr	8,48 µg
I	30,5 µg

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamiskvaliteet jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

1 - 2 pudelit päevas vähemalt 14 päeva, välja arvatud juhul kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti

Pakend: 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

Maitset: jahutavad marjad, jahutav virsik-mango



NUTRICIA

Nutridrink PlantBased

1,5 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5 kcal/ml
- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energia osakaal valkudest 16 E%, süsivesikutest 49 E%, rasvadest 35 E%
- Valgualikas: herne- (68%) ja sojavalk (32%)
- Sobib ka veganitele, sisaldab vetikatest saadud D3 vitamiini
- Laktoosita, gluteenita, lehmapiimavalguta

Kasutamisenäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivselt
- Pea- ja kaelakirurgia järgselt
- Tsüstiline fibroos

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Nutridrink® PlantBased mango-passion näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	630 kJ/150 kcal
Rasvad (35 E%)	5,8 g
millest: küllastunud rh	0,61 g
Süsivesikud (49 E%)	18,6 g
millest:	
suhkrud	9,4 g
laktoos	0 g
Kiudained (0 E%)	0,05 g
Valgud (16 E%)	6 g
Sool	0,25 g

Muud	
Koliin	50 mg
Osmolaarsus	617 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	93,8 µg RE
D ₃	2,69 µg
E	2,45 mg α-TE
K	8,75 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,20 mg
Niatsiin	2,13 mg NE
Pantoteenhape	0,95 mg
B ₆	0,21 mg
Foolhape	41,3 µg
B ₁₂	0,50 µg
Biotiin	6,40 µg
C	13,8 mg

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

1 - 3 pudelit lisaks muule toidule, 5 - 7 pudelit ainsa toiduna päevas, välja arvatud juhul kui arst või toitmisravispetsialist on soovitanud teisiti.

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitset: mango-passion, moka

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	101 mg
K	222 mg
Cl	155 mg
Ca	125 mg
P	77,0 mg
Mg	17,5 mg
Fe	2,07 mg
Zn	1,43 mg
Cu	200 µg
Mn	0,15 mg
F	0,17 mg
Mo	15,8 µg
Se	8,75 µg
Cr	4,38 µg
I	18,7 µg





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 42%, rasvadest 39%, kiudainetest 3%
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Valguallikas kaseiin
- Laktoosi – 0,6 g/100 ml
- Sisaldab mfc™ kiudainete segu
- Gluteenita

Kasutamisenäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Kõhulahtisus/kõhukinnisus
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivselt
- Neuroloogilised haigused (insult)
- Tsüstiline fibroos

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi kiudainetevaba dieedi korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	1007 kJ/240 kcal
Rasvad (39 E%)	10,4 g
millest: küllastunud rh	0,93 g
Süsivesikud (42 E%)	25,4 g
millest:	
suhkrud	13,4 g
laktoos	0,51 g
Kiudained (3 E%)	3,6 g
Valgud (16 E%)	9,5 g
Sool	0,21 g

Muud	
Koliin	80,8 mg
Osmolaarsus	790 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	234 µg RE
D ₃	1,8 µg
E	3,17 mg α-TE
K	13 µg
Tiamiin	0,44 mg
Riboflaviin	0,46 mg
Niatsiin	4,40 mg NE
Pantoteenhape	1,4 mg
B ₆	0,46 mg
Foolhape	61,3 µg
B ₁₂	0,70 µg
Biotiin	9,6 µg
C	24 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	83 mg
K	208 mg
Cl	82 mg
Ca	165 mg
P	174 mg
Mg	32,4 mg
Fe	3,86 mg
Zn	2,8 mg
Cu	430 µg
Mn	0,80 mg
F	0,18 mg
Mo	24 µg
Se	14 µg
Cr	16 µg
I	37,4 µg

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Ainsa toiduna päevas 5 - 7 pudelit
Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit
V.a.juhul, kui arst või toitmiseravi-spetsialist on soovitanud teisiti

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitseid: maasikas





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 11%, süsivesikutest 89%, rasvadest 0%, kiudainetest 0%
- Valguallikas: vadak
- Süsivesikute allikad: maltodekstriin ja sahharoos
- Kiudaineteta
- Gluteenita, laktoosita

Kasutamisenäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ja vajavad piiratud rasvasisaldusega toitu.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energijavajadus
- Pankreatiit
- Pre- ja postoperatiivselt
- Põletikuline soolehaigus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Nutridrink® Juicestyle apelsin näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	635 kJ/150 kcal
Rasvad (0 E%)	0 g
millest: küllastunud rh	0 g
Süsivesikud (89,3 E%)	33,5 g
millest:	
suhkrud	13,5 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (10,7 E%)	3,9 g
Sool	0,02 g

Muud	
Koliin	68,8 mg
Osmolaarsus	750 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	81,9 µg RE
D ₃	1,3 µg
E	2,3 mg α-TE
K	10 µg
Tiamiin	0,29 mg
Riboflaviin	0,32 mg
Niatsiin	2,94 mg NE
Pantoteenhape	1,0 mg
B ₆	0,33 mg
Foolhape	41,3 µg
B ₁₂	0,60 µg
Biotiin	6,0 µg
C	19 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	8,55 mg
K	9,69 mg
Cl	178 mg
Ca	25 mg
P	12 mg
Mg	1,64 mg
Fe	2,50 mg
Zn	1,8 mg
Cu	340 µg
Mn	0,15 mg
F	0,17 mg
Mo	9,8 µg
Se	8,7 µg
Cr	7,9 µg
I	24,9 µg

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitumisravi-spetsialist on soovitanud teisiti

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitset: õun, apelsin



21.



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,28 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 28%, süsivesikutest 46%, rasvadest 26%, kiudainetest 0%
- Laktoosi – 1,7 g/100 ml
- Kõrge valgu- ja arginiini sisaldusega haavade paranemise soodustamiseks
- Suurem antioksidantide sisaldus (karotenoidid, C- ja E-vitamiinid, tsink) haavade paranemise soodustamiseks
- Madala rasvasisaldusega
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisanõudused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine ning lisatoitainete vajadus lamatiste või haavade tõttu.

- Lamatised
- Suured pea- ja kaela- ning kõhupiirkonna operatsioonid
- Põletused
- Alatoitumus või selle risk

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi kriitiliselt haigetele patsientidele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 17 aastat tarbida ettevaatlikult



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Cubitan® vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	520 kJ/124 kcal
Rasvad (26 E%)	3,5 g
millest: küllastunud rh	0,5 g
Süsivesikud (46 E%)	14,5 g
millest:	
suhkrud	7,1 g
laktoos	1,7 g
Kiudained (0 E%)	<0,5 g
Valgud (28 E%)	8,8 g
millest: L-karnitiin	1,51 g
Sool	0,13 g

Muud	
Karotenoidid	0,75 mg
Koliin	69 mg
Osmolaarsus	500 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	119 µg RE
D ₃	1,3 µg
E	19 mg α-TE
K	10 µg
Tiamiin	0,28 mg
Riboflaviin	0,63 mg
Niatsiin	3,4 mg NE
Pantoteenhape	1,0 mg
B ₆	0,65 mg
Foolhape	100 µg
B ₁₂	0,79 µg
Biotiin	7,5 µg
C	125 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	50 mg
K	150 mg
Cl	80 mg
Ca	225 mg
P	182 mg
PO ₄	558 mg
Mg	42 mg
Fe	3,0 mg
Zn	4,5 mg
Cu	680 µg
Mn	1,3 mg
F	0,19 mg
Mo	19 µg
Se	32 µg
Cr	13 µg
I	25 µg

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitset: vanilje, maasikas, šokolaad





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 8%, süsivesikutest 47%, rasvadest 45%, kiudainetest 0%
- Laktoosi – <0,05 g/100 ml
- Madal valgusisaldus
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Madal Na, K, Cl, Ca, P, Mg sisaldus
- Suurem antioksidantide sisaldus: karotenoidid, E-vitamiin, tsink, seleen
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisläbikäigused

Valgu-, mineraalainete- ja vedelikupiirangut vajavatele patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ja vajavad täiendavat toetust.

- Neerupuudulikkus
- Neeruasendusravi

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.



Toitumislane teave 100 ml tootes

Energia	838 kJ/200 kcal
Rasvad (45 E%)	10,0 g
millest: küllastunud rh	0,84 g
Süsivesikud (47 E%)	23,6 g
millest:	
suhkrud	5,0 g
laktoos	<0,05 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (8 E%)	4,0 g
Sool	0,09 g

Muud	
L-karnitiin	14,8 mg
Karotenoidid	0,45 mg
Tauriin	15 mg
Koliin	73,4 mg
Osmolaarsus	455 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	0 µg RE
D ₃	1,45 µg
E	5,0 mg α-TE
K	11 µg
Tiamiin	0,30 mg
Riboflaviin	0,38 mg
Niatsiin	3,62 mg NE
Pantoteenhape	1,06 mg
B ₆	0,6 mg
Foolhape	100 µg
B ₁₂	0,47 µg
Biotiin	8,0 µg
C	6,0 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	37,8 mg
K	27,9 mg
Cl	<7,0 mg
Ca	<7,5 mg
P	<6,0 mg
Mg	<1,5 mg
Fe	3,2 mg
Zn	2,71 mg
Cu	400 µg
Mn	0,75 mg
F	0,20 mg
Mo	17 µg
Se	16 µg
Cr	13 µg
I	26,9 µg

Doseerimine

Lisaks muule toidule:
Täiskasvanutele 1 - 3 pudelit päevas
Lastele – ainult meditsiinitöötaja soovitusel
V.a.juhul, kui arst või toitmisravi-spetsialist on soovitanud teisiti

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitseid: aprikoos





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 15%, süsivesikutest 40%, rasvadest 45%, kiudainetest 0%
- Laktoosi – 0,06 g/100 ml
- Valgusisalduselt sobib dialüüsi patsientidele
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Madal Na, K, Cl, Ca, P, Mg sisaldus
- Suurem antioksidantide sisaldus: karotenoidid, E-vitamiin, tsink, seleen
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisinäidustused

Valgu-, mineraalainete- ja vedelikupiirangut vajavatele patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ja vajavad täiendavat toetust.

- Neerupuudulikkus
- Dialüüsi patsient
- Diabeetiline nefropaatia

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.



Toitumislane teave 100 ml tootes

Energia	835 kJ/200 kcal
Rasvad (45 E%)	10,0 g
millest: küllastunud rh	0,94 g
Süsivesikud (40 E%)	20,0 g
millest:	
suhkrud	4,9 g
laktoos	<0,10 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (15 E%)	7,5 g
Sool	0,15 g

Muud	
L-karnitiin	14,9 mg
Karotenoidid	0,47 mg
Tauriin	15,8 mg
Koliin	40 mg
Osmolaarsus	410 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	0 µg RE
D ₃	0 µg
E	5,05 mg α-TE
K	11,2 µg
Tiamiin	0,29 mg
Riboflaviin	0,40 mg
Niatsiin	3,69 mg NE
Pantoteenhape	1,14 mg
B ₆	0,95 mg
Foolhape	99,2 µg
B ₁₂	0,53 µg
Biotiin	8,0 µg
C	6,0 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	61 mg
K	34 mg
Cl	<15,0 mg
Ca	<11,0 mg
P	<9,0 mg
PO ₄	<27,6 mg
Mg	<2,0 mg
Fe	2,0 mg
Zn	2,0 mg
Cu	420 µg
Mn	0,78 mg
F	0,20 mg
Mo	15 µg
Se	17 µg
Cr	9 µg
I	27,1 µg

Doseerimine

Lisaks muule toidule:
Täiskasvanutele 1 - 3 pudelit päevas
Lastele – ainult meditsiinitöötaja soovitusel
V.a.juhul, kui arst või toitmisravi-spetsialist on soovitanud teisiti

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitseid: karamell





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 0%, süsivesikutest 100%, rasvadest 0%, kiudainetest 0%
- Sisaldab süsivesikuid ja elektrolüüte
- Laktoosita
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisanäidustused

Operatsioonieelselt organismi energia- ja vedelikuvajaduse katmiseks ning operatsioonijärgse insuliiniresistentsuse vähendamiseks.

- Plaanilised operatsioonid

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ja väikelastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Lastel ja diabeetikutel kasutada ettevaatlikult

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	215 kJ/50 kcal
Rasvad (0 E%)	0 g
millest: küllastunud rh	0 g
Süsivesikud (100 E%)	12,6 g
millest:	
suhkrud	2,1 g
laktoos	<0,006 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (0 E%)	0 g
Sool	0,13 g

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	50 mg
K	122 mg
Cl	6 mg
Ca	6 mg
P	1 mg
Mg	1 mg

Muud	
Osmolaarsus	240 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	92 ml

Doseerimine

Operatsioonieelsel öhtul: 4 × 200 ml

Operatsioonipäeval kuni 2 tundi enne (pre)anesteesiat: 2 × 200 ml

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitseid: sidrun





Toote iseloomustus

- Rasvaemulsioon
- Energiasisaldus – 4,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 0%, süsivesikutest 0%, rasvadest 100%, kiudainetest 0%
- Taimsete õlide segu, polüküllastumata rasvhapete rikas
- Sisaldab väikestes kogustes Na ja Cl
- Ei sisalda mikroelemente ega vitamiine
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisinäidustused

Kõrge energiavajadusega patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Onkoloogilised haigused
- Neeruhaigused
- Tsüstiline fibroos
- Isutus
- HIV

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses alla 6 aastat tarbida ettevaatlikult

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Lastele alla 5 aastat on soovitatav lahjendada. Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 14 päeva jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	1850 kJ/450 kcal
Rasvad (100 E%)	50,0 g
millest: küllastunud rh	5,3 g
Süsivesikud (0 E%)	0,1 g
millest: suhkrud	0 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (0 E%)	0 g
Sool	0,02 g

Mineraalained ja mikroelemendid

Na	7 mg
Cl	0,1 mg

Muud

Osmolaarsus	0 mOsmol/l
-------------	------------

Doseerimine

Lisaks muule toidule 3 x 30 ml/päevas

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 x 200 ml)

Maitset: neutraalne





Toote iseloomustus

- Pulbriline toit
- Energiasisaldus – 1 kcal/ml või 1,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16%, süsivesikutest 49%, rasvadest 35%, kiudainetest 0%
- Valguallikas – lehmapiima kaseiin
- Sisaldab antioksidantse toimega karotenoide
- Kiudaineteta
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisläbikäik

Kasutatakse patsientide toitmiseks sondi kaudu, juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav.

- Alatoitumus või selle risk
- Düsfagia
- Isutus
- Dementsus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ja galaktoseemia haigetele
- Ei sobi lehmapiimavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toode tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Toitumislane teave 100 ml tootes

Energia	1943 kJ/463 kcal
Rasvad (35 E%)	18,2 g
millest: küllastunud rh	8,5 g
Süsivesikud (49 E%)	56,6 g
millest:	
suhkrud	8,7 g
laktoos	<0,14 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (16 E%)	18,2 g
Sool	1,2 g

Muud	
Karotenoidid	0,74 mg
Koliin	165 mg
Osmolaarsus	320 mOsm/l

Vitamiinid	
A	381 µg RE
D ₃	6,01 µg
E	5,94 mg α-TE
K	24,4 µg
Tiamiin	0,69 mg
Riboflaviin	0,74 mg
Niatsiin	8,3 mg NE
Pantoteenhape	2,45 mg
B ₆	0,79 mg
Foolhape	123 µg
B ₁₂	1,02 µg
Biotiin	19,7 µg
C	59,5 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	472 mg
K	706 mg
Cl	578 mg
Ca	370 mg
P	290 mg
PO ₄	890 mg
Mg	69,3 mg
Fe	7,38 mg
Zn	5,54 mg
Cu	830 µg
Mn	0,93 mg
F	0,48 mg
Mo	48,6 µg
Se	26,4 µg
Cr	25,7 µg
I	63,1 µg

Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud vesi valada steriilsesse nõusse ja lisada vajalik arv mõõtlusikatäisi Nutrison pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud.
5 mõõtlusikatäit + 85 ml vett = 100 ml toitelahust energiatihedusega 1 kcal/ml. Valmis toitelahus kasutada ära 4 tunni jooksul. Manustada sondi kaudu.

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitmisravispetsialisti soovitudele.
Mõõtlusikatäis pulbrit = 4,3 g pulbrit (20 kcal)

Pakend: 430 g purk





Toote iseloomustus

- Pulber
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,68 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 95%, süsivesikutest 1%, rasvade 4%, kiudainetest 0%
- Valguallikas – lehmapiimavalk
- Madala rasvasisaldusega
- Gluteenita

Kasutamisinäidustused

Kasutatakse lisandina toidule, kui tavalisest toidust ja joogist ei piisa valguvajaduse katmiseks.

- Põletused
- Haavad, lamatised
- Valgukaotus eritiste ja vedelikega

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aastastele lastele ja galaktoseemia haigetele
- Ei sobi lehmapiimavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud ja jahutatud vesi valada puhtasse nõusse ja lisada vajalik arv mõõtlusikatäisi Protifari pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud ja moodustub homogeenne pasta, mida saab lisada toitudele ja jookidele. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Protifariga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	1560 kJ/368 kcal
Rasvad (4 E%)	1,6 g
millest: küllastunud rh	1,2 g
Süsivesikud (1 E%)	<1,5 g
millest: suhkrud	<1,5 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (95 E%)	87,2 g
Sool	0,25 g

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	140 mg
Cl	80 mg
Ca	1350 mg
P	700 mg
Mg	≤20 mg

Muud	
Osmolaarsus	25 mOsmol/l



Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 2,5 g pulbrit (2,2 g valku)

Pakend: 225 g purk





Toote iseloomustus

- Pulber
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,84 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0%, süsivesikutest 100%, rasvadest 0%, kiudainetest 0%
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Ei sisalda piimavalke ega rasvu
- Gluteenita, laktoosita

Kasutamisinäidustused

Suurenenud energiavajadusega alatoitumuses patsientidele või neile, kes ei saa toidust piisavalt energiat.

- Seede probleemid, valgu ja/või rasva imendumishäired
- Maksapuudulikkus
- Laktoosi või sahharoosi imendumishäired

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud ja jahutatud vesi valada puhtasse nõusse ja lisada vajalik arv mõõtlusikatäisi Fantomalti pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud ja moodustub homogeenne pasta, mida saab lisada toitule ja jookidele. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõuded: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Fantomaltiga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	1630 kJ/384 kcal
Rasvad (0 E%)	0 g
millest: küllastunud rh	0 g
Süsivesikud (100 E%)	96 g
millest: suhkrud	6,0 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (0 E%)	0 g
Sool	0,005 g

Mineraalained ja mikroelemendid

Na	2 mg
----	------



Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 5 g pulbrit (19 kcal)

Pakend: 400 g purk



Toote iseloomustus

- Pulber vedeliku ja toidu paksendamiseks, ei muutu amülaasi toimetel vedelaks
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,6 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0%, süsivesikutest 97%, rasvadest 0%, kiudainetest 3%
- Sisaldab maltodekstriini (modifitseeritud maisitärklisest)
- Gluteenita, laktoosita

Kasutamisinäidustused

- Neelamishäiretega patsientidele, kelle toitu või vedelikku on vaja paksendada

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Lisage arsti või toitumisspetsialisti poolt soovitatud koguses Nutlis pulbrit toidule. Raputage, loksutage või segage kuni pulber on täielikult lahustunud. Laske segul mõni minut pakseneda. Ärge lisage sel ajal pulbrit juurde, sest segu paksenemine alles jätkub. Paksendatud toitu saab kuumutada, jahutada või külmutada. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõuded: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Nutlis pulbriga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	1545 kJ/363 kcal
Rasvad (0 E%)	0,1 g
millest: küllastunud rh	0,1 g
Süsivesikud (97 E%)	87,5 g
millest: suhkrud	1,5 g
Kiudained (3 E%)	5,8 g
Valgud (0 E%)	0,26 g
Sool	<0,20 g

Mineraalained ja mikroelemendid*	
Na	<91 mg
K	<75 mg
Cl	<35 mg
Ca	<21 mg
P	<17 mg
Mg	<3,5 mg

*Miineraalid esinevad toorainetes nende looduslikul tasemel

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele.
Mõõtlusikatäis pulbrit = 4 g pulbrit

Pakend: 300 g purk





Toote iseloomustus

- Pulber vedeliku ja toidu paksendamiseks, ei muutu amülaasi toimetel vedelaks
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,63 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0%, süsivesikutest 96%, rasvadest 0%, kiudainetest 4%
- Sisaldab maltodekstriini (modifitseeritud maisitärklisest)
- Gluteenita, laktoosita

Kasutamisinäidustused

- Neelamishäiretega patsientidele, kelle toitu või vedelikku on vaja paksendada

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Lisage arsti või toitumisspetsialisti poolt soovitatud koguses Nutlis Clear pulbrit toidule. Raputage, loksutage või segage kuni pulber on täielikult lahustunud. Laske segul mõni minut pakseneda. Ärge lisage sel ajal pulbrit juurde, sest segu paksenemine alles jätkub. Paksendatud toitu saab kuumutada, jahutada või külmutada. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõuded: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Nutlis Cleariga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.



Toitumisolane teave 100 ml tootes

Energia	1217 kJ/290 kcal
Rasvad (0 E%)	0 g
millest: küllastunud rh	0 g
Süsivesikud (80 E%)	57,6 g
millest: suhkrud	3,7 g
Kiudained (19 E%)	28 g
Valgud (1 E%)	0,8 g
Sool	3,8 g

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	1500 mg
K	<40 mg
Cl	<30 mg
Ca	<20 mg
P	<50 mg
Mg	<20 mg

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 3 g pulbrit

Pakend: 175 g purk





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 10%, süsivesikutest 41%, rasvadest 48%, kiudainetest 1%
- Valku – 2,6 g/100 ml, vadakuvalk ja kaseiin proportsioonis 60:40
- Asendamatud pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped: AA (25,3 mg/100 ml), DHA (25,2 mg/100 ml)
- Süsivesikute allikas - aeglaselt imenduv maltodekstriin ja laktoos
- Sisaldab prebiootiliste omadustega kiudaineid GOS/FOS immuunsüsteemi toetamiseks ja nukleotide
- Osmolaarsus – 305 mOsmol/l
- Gluteenita

Kasutamisinäidustused

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Kasutatakse imikute enteraalseks toitmiseks ebapiisava kaaluibe, suurema energiavajaduse ja/või vedeliku piirangu korral. Sobib 0 - 18 kuu vanuses või kuni kehakaaluni 9 kg ainsa toiduna päevas.

- Neelamishäired (toitmine sondi kaudu)
- Tsüstiline fibroos
- PCI
- Operatsioonijärgses taastumisperioodis
- Südamepuudulikkus
- Bronhopulmonaalne düsplasia

Vastunäidustused

- Ei sobi galaktoosemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib kasutamiseks ainsa toiduna kuni 18 kuu vanuseni või kehakaalu 9 kg saavutamiseni
- Rinnapiim on lapsele parim, see toidab, kaitseb ja arendab!

Kasutamine ja säilitamine

Kasutamisel valmis toitelahus lapse toitmiseks tassist, pudelist või sondi kaudu. Enne kasutamist loksutada pudelit. Toitu manustatakse soojendatuna vähemalt toatemperatuurini. Jälgida hügieenireegleid: pesta käed, kasutada steriliseeritud nõusid. Sondiga toitmisel tuleb avatud pakend kasutada ära 4 tunni jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	418 kJ/100 kcal
Rasvad (48 E%)	5,3 g
millest:	
küllastunud rh	2,5 g
monoküllastumata rh	2,0 g
polüküllastumata rh	0,88 g
arahidoonhape (AA)	25,3 mg
dokosaheksaenhape (DHA)	25,2 mg
Süsivesikud (41 E%)	10,2 g
millest:	
suhkrud	5,9 g
laktoos	5,33 g
Kiudained (1 E%)	0,57 g
Valgud (10 E%)	2,6 g
Sool	0,09 g

Muud	
Nukleotiidid	3,6 mg
L-karnitiin	2,0 mg
Koliin	31,3 mg
Inositol	25 mg
Tauriin	7 mg
Osmolaarsus	305 mOsmol/l

NB!

100% soodustusega 0 - 12 kuu vanuses, diagnoosikoodiga E42, juhul kui on paigaldatud gastrostoom või jejunostoom

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst, või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 125 ml plastpudel
(1 originaal = 24 pudelit)

Vitamiinid	
A	88 µg RE
D ₃	2,4 µg
E	2,1 mg α-TE
K	6,7 µg
Tiamiin	150 µg
Riboflaviin	200 µg
Niatsiin	1,47 mg
Pantoteenhape	0,80 mg
B ₆	110 µg
Foolhape	26,7 µg DFE
B ₁₂	0,30 µg
Biotiin	4,0 µg
C	14 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	37 mg
K	111 mg
Cl	75 mg
Ca	100 mg
P	50 mg
Mg	153 mg
Fe	9,0 mg
Zn	1,2 mg
Cu	0,8 mg
Mn	75 µg
F	6 µg
Mo	<8 µg
Se	3,75 µg
Cr	<8 µg
I	19 µg





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 11%, süsivesikutest 40%, rasvadest 49%
- Valku – 2,6 g/100 ml
- Sisaldab täielikult hüdrolyüsitud vadakuvalku, mis on kergesti seeditav ja hästi talutav
- Sisaldab lühikese ahelaga peptiide ja vabasid aminohappeid, mis tagab imendumishäirete korral toidu efektiivse seedimise ja/või imendumise
- 50% keskmise ahelaga rasvhappeid (MCT) ja 50% pika ahelaga rasvhappeid (LCT), mis parandab toitainete imendumist ja taluvust
- Süsivesikute allikas – kergesti imenduv maltodekstriin
- Kiudaineteta
- Gluteenita
- Osmolaarsus – 295 mOsmol/l

Kasutamisenäidustused

Meditasiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Kasutatakse imikute enteralseks toitmiseks ebapiisava kaaluibee, suurema energiavajaduse, vedeliku piirangu korral, millega kaasnevad seede ja/või imendumisprobleemid ning toidutalumatus. Sobib 0 - 18 kuu vanuses või kuni kehakaaluni 9 kg ainsa toiduna päevas.

- Tsüstiline fibroos
- Pankreatiit
- Krooniline maksapuudulikkus
- Mittespetsiifiline soolte põletik
- Lühikese soole sündroom
- Toitmine peensoole

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib kasutamiseks ainsa toiduna kuni 18 kuu vanuseni või kehakaalu 9 kg saavutamiseni
- Rinnapiim on lapsele parim, see toidab, kaitseb ja arendab!

Kasutamine ja säilitamine

Kasutamisel valmis toitelahus lapse toitmiseks tassist, pudelist või sondi kaudu. Enne kasutamist loksutada pudelit. Toitu manustatakse soojendatuna vähemalt toatemperatuurini. Jälgida hügieenireegleid:

pesta käed, kasutada steriliseeritud nõusid. Sondiga toitmisel tuleb avatud pakend kasutada ära 4 tunni jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	418 kJ/100 kcal
Rasvad (49 E%)	5,4 g
millest:	
küllastunud rh	3,8 g
MCT	2,8 g
monoküllastumata rh	0,77 g
polüküllastumata rh	0,86 g
arahidoonhape (AA)	25,2 mg
eikosapentaenehappe (EPA)	25,0 mg
Süsivesikud (41 E%)	10,2 g
millest:	
suhkrud	2,7 g
laktoos	<0,10 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (10 E%)	2,6 g
Sool	0,09 g

Muud	
Nukleotiidid	3,60 mg
L-karnitiin	2,0 mg
Koliin	32,1 mg
Inositol	25 mg
Tauriin	7 mg
Osmolaarsus	295 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	88 µg RE
D ₃	2,4 µg
E	2,10 mg α-TE
K	6,7 µg
Tiamiin	150 µg
Riboflaviin	200 µg
Niatsiin	1,67 mg
Pantoteenhape	0,80 mg
B ₆	110 µg
Foolhape	16 µg
Folaadid	26,7 µg DFE
B ₁₂	0,30 µg
Biotiin	4,00 µg
C	14,0 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	37 mg
K	111 mg
Cl	75 mg
Ca	90 mg
P	45 mg
Mg	9,0 mg
Fe	1,2 mg
Zn	0,8 mg
Cu	75,0 µg
Mn	6,0 µg
Mo	6,0 µg
Se	3,75 µg
Cr	4,0 µg
I	19,0 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 200 ml plastpudel





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 10%, süsivesikutest 50%, rasvadest 40%
- Valku – 2,5 g/100 ml
- Vadakuvalgu ja kaseiini vahekord: 60:40
- Sisaldab pika ahelaga asendamatuid rasvhappeid: EPA (8,41 mg/100 ml ja DHA (35,7 mg/100 ml)
- Süsivesikute allikas – kergesti imenduv maltodekstriin
- Osmolaarsus – 200 mOsmol / l
- Kiudaineteta
- Gluteeni- ja laktoosita

Kasutamisinäidustused

Meditasiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Kasutatakse laste enteraalseks toitmiseks ebapiisava kaaluilbe, suurema energiavajaduse ja vedeliku piirangu korral. Sobib 1 - 6 aasta vanuses või kehakaalu vahemikus 9 - 20 kg ainsa toiduna päevas.

- Düsfaagia
- Isutus
- Operatsioonist taastumise periood
- Intensivravi
- Põletikuline soolehaigus

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib kasutamiseks ainsa toiduna 1 - 6 aasta vanuses (9 - 20 kg)
- Toitu ei lahjendata ja selle sisse ei tohi manustada ravimeid

Vastunäidustused

- Ei tohi manustada parenteraalselt
- Ei sobi galaktoseemia korral, ei sobi imikueas

Kasutamine ja säilitamine

Kasutamisel valmis toitelahus lapse toitmiseks tassist, pudelist või sondi kaudu. Enne kasutamist loksutada pudelit. Toitu manustatakse soojendatuna vähemalt toatemperatuurini. Jälgida hügieenireegleid: pesta käed, kasutada steriliseeritud nõusid. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	420 kJ/100 kcal
Rasvad (40 E%)	4,4 g
millest:	
küllastunud rh	0,5 g
monoküllastumata rh	2,6 g
polüküllastumata rh	1,3 g
dokosaheksaenehape (DHA)	35,7 mg
eikosapentaenehape (EPA)	8,41 mg
Süsivesikud (50 E%)	12,5 g
millest:	
suhkrud	0,8 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (10 E%)	2,5 g
Sool	0,15 g

Muud	
Karotenoidid	0,10 mg
L-karnitiin	2,0 mg
Koliin	20 mg
Tauriin	7,5 mg
Osmolaarsus	200 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	85 ml

Vitamiinid	
A	41 µg RE
D ₃	1,0 µg
E	1,3 mg α-TE
K	4,0 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,1 mg NE
Pantoteenhape	0,33 mg
B ₆	0,12 mg
Foolhape	15 µg
B ₁₂	0,25 µg
Biotiin	4,0 µg
C	10 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	60 mg
K	110 mg
Cl	95 mg
Ca	60 mg
P	50 mg
Mg	11 mg
Fe	1,0 mg
Zn	1,0 mg
Cu	80 µg
Mn	0,15 mg
F	0,07 mg
Mo	4,0 µg
Se	3,0 µg
Cr	3,5 µg
I	10 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 200 ml plastpudel





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 10%, süsivesikutest 49%, rasvadest 39%, kiudainetest 2%
- Valku – 2,5 g/100 ml
- Vadakuvalgu ja kaseiini vahekord: 60:40
- Sisaldab pika ahelaga asendamatuid rasvhappeid: EPA (8,41 mg/100 ml ja DHA (35,7 mg/100 ml)
- Süsivesikute allikas – kergesti imenduv maltodekstriin
- Osmolaarsus – 205 mOsmol / l
- Sisaldab MF 6 kiudainetesegu
- Gluteeni- ja laktoosita

Kasutamisanäidustused

Meditasiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Kasutatakse laste enteraalseks toitmiseks ebapiisava kaaluilbe, suurema energiavajaduse ja vedeliku piirangu korral. Sobib 1 - 6 aasta vanuses või kehakaalu vahemikus 9 - 20 kg ainsa toiduna päevas.

- Düsfaagia
- Isutus
- Operatsioonist taastumise periood
- Intensiivravi
- Põletikuline soolehaigus

Vastunäidustused

- Ei tohi manustada parenteraalselt
- Ei sobi galaktoseemia korral, ei sobi imikueas

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib kasutamiseks ainsa toiduna 1 - 6 aasta vanuses (9 - 20 kg)
- Toitu ei lahjendata ja selle sisse ei tohi manustada ravimeid

Kasutamine ja säilitamine

Kasutamisel valmis toitelahus lapse toitmiseks tassist, pudelist või sondi kaudu. Enne kasutamist loksutada pudelit. Toitu manustatakse soojendatuna vähemalt toatemperatuurini. Jälgida hügieenireegleid: pesta käed, kasutada steriliseeritud nõusid. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	425 kJ/101 kcal
Rasvad (39 E%)	4,4 g
millest:	
küllastunud rh	0,5 g
monoküllastumata rh	2,6 g
polüküllastumata rh	1,3 g
dokosaheksaenhape (DHA)	35,7 mg
eikosapentaenhape (EPA)	8,41 mg
Süsivesikud (49 E%)	12,5 g
millest:	
suhkrud	0,8 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	0,8 g
Valgud (10 E%)	2,5 g
Sool	0,15 g

Muud	
Karotenoidid	0,10 mg
L-karnitiin	2,0 mg
Koliin	20 mg
Tauriin	7,5 mg
Osmolaarsus	205 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	85 ml

Vitamiinid	
A	41 µg RE
D ₃	1,0 µg
E	1,3 mg α-TE
K	4,0 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,1 mg NE
Pantoteenhape	0,33 mg
B ₆	0,12 mg
Foolhape	15 µg
B ₁₂	0,25 µg
Biotiin	4,0 µg
C	10 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	60 mg
K	110 mg
Cl	95 mg
Ca	60 mg
P	50 mg
Mg	11 mg
Fe	1,0 mg
Zn	1,0 mg
Cu	80 µg
Mn	0,15 mg
F	0,07 mg
Mo	4,0 µg
Se	3,0 µg
Cr	3,5 µg
I	10 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend

500 ml pehme kollabeeruv plastpudel



Nutrini Energy Multi Fibre

Vanus:
1 - 6 aastat



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 11%, süsivesikutest 49%, rasvadest 39%, kiudainetest 1%
- Valku – 4 g/100 ml
- Sisaldab vadakuvalku ja kaseiini
- Sisaldab pika ahelaga asendamatuid rasvhappeid: EPA (12,6 mg/100 ml) ja DHA (53,1 mg/100 ml)
- Süsivesikute allikas – kergesti imenduv maltodekstriin
- Sisaldab MF 6 kiudainetesegu
- Osmolaarsus – 315 mOsmol/l
- Gluteeni- ja laktoosita

Kasutamisläidustused

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Kasutatakse laste enteraalseteks toitmiseks ebapiisava kaaluilbe, suurema energiavajaduse ja vedeliku piirangu korral. Sobib 1 - 6 aasta vanuses või kehakaalu vahemikus 9 - 20 kg ainsa toiduna päevas.

- Düsfaagia
- Tsüstiline fibroos
- Isutus
- Operatsioonist taastumise periood
- Südamepuudulikkus
- Keemia- ja kiiritusravi järgselt
- Kõhukinnisuse või kõhulahtisuse korral

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi galaktoseemia korral ja imikueas

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib kasutamiseks ainsa toiduna 1 - 6 aasta vanuses (9 - 20 kg)
- Toitu ei lahjendata ja selle sisse ei tohi manustada ravimeid

Kasutamine ja säilitamine

Kasutamisel valmis toitelahus lapse toitmiseks tassist, pudelist või sondi kaudu. Toitu manustatakse soojendatuna vähemalt toatemperatuuril.

Jälgida hügieenireegleid: pesta käed, kasutada steriliseeritud nõusid.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	635 kJ/151 kcal
Rasvad (39 E%)	6,7 g
millest:	
küllastunud rh	0,8 g
monoküllastumata rh	3,9 g
polüküllastumata rh	2,0 g
dokosaheksaenehape (DHA)	53,1 mg
eikosaheksaenehape (EPA)	12,6 mg
Süsivesikud (49 E%)	18,5 g
millest:	
suhkrud	1,1 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (1 E%)	0,8 g
Valgud (11 E%)	4,0 g
Sool	0,23 g

Muud	
Karotenoidid	0,15 mg
L-karnitiin	3,0 mg
Koliin	30 mg
Tauriin	11 mg
Osmolaarsus	315 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	77 ml

Vitamiinid	
A	61 µg RE
D ₃	1,5 µg
E	1,9 mg α-TE
K	6,0 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	1,7 mg NE
Pantoteenhape	0,5 mg
B ₆	0,18 mg
Foolhape	23 µg
B ₁₂	0,27 µg
Biotiin	6,0 µg
C	15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	90 mg
K	165 mg
Cl	143 mg
Ca	90 mg
P	75 mg
PO ₄	230 mg
Mg	17 mg
Fe	1,5 mg
Zn	1,5 mg
Cu	120 µg
Mn	0,23 mg
F	0,11 µg
Mo	6,0 µg
Se	4,5 µg
Cr	5,3 µg
I	15 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend

500 ml pehme kollabeeruv plastpudel





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 11%, süsivesikutest 54%, rasvadest 35%
- Valku – 2,8 g/100 ml
- Sisaldab täielikult hüdrolüüsitud vadakuvalku, mis on kergesti seeditav ja hästi talutav
- 50% keskmise ahelaga rasvhappeid (MCT) ja 50% pika ahelaga rasvhappeid (LCT), mis parandab toitainete imendumist ja taluvust
- Süsivesikute allikas – kergesti imenduv maltodekstriin
- Kiudaineteta
- Gluteenita
- Osmolaarsus – 295 mOsmol/l

Kasutamisenäidustused

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Kasutatakse enteraalseks toitmiseks ebapiisava kaaluibe, suurema energiavajaduse, vedeliku piirangu korral, millega kaasnevad seede ja/või imendumisprobleemid ning toidutalumus. Sobib 1 - 6 aasta vanustele lastele või kehakaalu 9 - 20 kg korral ainsa toiduna päevas.

- Kriitiline seisund
- Traumad, põletused, sepsis
- Tsüstiline fibroos
- Pankreatiit
- Krooniline maksapuudulikkus
- Mittespetsiifiline soolte põletik
- Lühikese soole sündroom
- Toitmine peensooles

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kasutamiseks imikueas

Kasutamine ja säilitamine

Kasutamisel valmis toitelahus. Enne kasutamist kontrollida toidu väljanägemist ja loksutada pudelit. Toitu manustatakse soojendatuna vähemalt toatemperatuurini. Aseptiliselt käideldud pakend säilib toatemperatuuril statiiivil 24 tundi. Kui kork on eemaldatud (avatud süsteem) on statiiivil rippumise aeg kuni 8 tundi. Avatud pakend säilib külmikus 24 tundi.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	419 kJ/100 kcal
Rasvad (35 E%)	3,9 g
millest:	
küllastunud rh	2,3 g
MCT	1,8 g
Süsivesikud (54 E%)	13,6 g
millest:	
suhkrud	0,43 g
laktoos	<0,15 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (11 E%)	2,8 g
Sool	0,14 g

Muud	
Karotenoidid	0,08 mg
L-karnitiin	1,98 mg
Koliin	20 mg
Tauriin	7,53 mg
Osmolaarsus	295 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	85 ml

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Ainult enteraalseks toitmiseks
- Toode sobib kasutamiseks ainsa toiduna 1 - 6 aasta vanuses või kehakaaluga 9 - 20 kg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend

500 ml pehme kollabeeruv plastpudel

Vitamiinid	
A	41 µg RE
D ₃	1,0 µg
E	1,25 mg α-TE
K	5,4 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,1 mg NE
Pantoteenhape	0,33 mg
B ₆	0,12 mg
Foolhape	15,4 µg
B ₁₂	0,28 µg
Biotiin	4,0 µg
C	10 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	57,7 mg
K	109 mg
Cl	106 mg
Ca	58,5 mg
P	51,3 mg
Mg	11,1 mg
Fe	1,0 mg
Zn	0,97 mg
Cu	91 µg
Mn	0,15 mg
F	0,06 µg
Mo	6,74 µg
Se	3,01 µg
Cr	3,5 µg
I	9,96 µg



NUTRICIA
**NutriKid
Multi Fibre**

**Vanus: alates
1 aasta vanusest**



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5 kcal/ml
- Täisväärtuslik kasutusvalmis kiudainetega energiarikas jook
- Energia osakaal valkudest 9%, rasvadest 40%, süsivesikutest 49%, kiudainetest 2%
- Sisaldab MF6 kiudainete segu (lahustuvad (47%) ja lahustumatud (53%))
- Gluteeni- ja laktoosivaba

Kasutamised

Meditatsioonilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Dieetraviks haigustest tingitud alatoitumuse ja kasvuprobleemide korral

- Kui laps ei suuda piisavalt suu kaudu süüa tavatoitu või keeldub sellest
- Antibiootikumide võtmise ajal või pärast ravi nendega
- Kõhulahtisus või kõhukinnisus
- Isutus
- Sage haigestumine, korduvad infektsioonid
- Ravitoiduna haiguste korral, millega toetäiendusega kaasneb alatoitumus

Vastunäidustused

- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei tohi kasutada parenteraalseks toitumiseks

Oluline teave

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Toode sobib ainsa toitainelikkana alates 1 aasta vanustele lastele
- Suure kiudainesisalduse tõttu kasutada noorematel lastel ettevaatlikult, juhul kui tarbitakse üle 4 pudeli päevas



Toitumistalane teave 100 ml tootes

Energia	640 kJ/153 kcal
Rasvad (40 E%)	6,8 g
millest: küllastunud rh	0,7 g
Süsivesikud (49 E%)	18,8 g
millest:	
suhkrud	7,4 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (9 E%)	3,3 g
Sool	0,16 g

Muud	
Karotenoidid	0,15 mg
L-karnitiin	3 mg
Koliin	30 mg
Tauriin	11 mg
Osmolaarsus	440 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	61 µg RE
D ₃	1,5 µg
E	1,9 mg α-TE
K	6,0 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	1,65 mg NE
Pantoteenhape	0,50 mg
B ₆	0,18 mg
Foolhape	23 µg
B ₁₂	0,26 µg
Biotiin	6,0 µg
C	15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	65 mg
K	153 mg
Cl	92 mg
Ca	84 mg
P	75 mg
Mg	17 mg
Fe	1,5 mg
Zn	1,5 mg
Cu	135 µg
Mn	0,23 mg
F	0,11 mg
Mo	6,0 µg
Se	4,5 µg
Cr	9,0 µg
I	15,0 µg

Kasutamine ja säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas kohas. Enne tarbimist korralikult raputada. Kasutamiskvalmis jook. Soovitav kasutada jahutatult. Avatud pudel sulgeda korralikult ja säilitada külmikus kuni 24 tundi. Otse pudelist tarbimisel visata ülejäägid ära. Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitumisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit.

Pakend: 200 ml plastpudel

Maitseid: maasikas, šokolaad





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,68 kcal/ml
- Vabadel aminohapetel baseeruv pulbriline täisväärtuslik toitesegu
- Sisaldab probiootikumi *Bifidobacterium breve* M-16V ja prebiootikume lcfOS ja scFOS
- Energia osakaal valkudest 11%, rasvadest 45%, süsivesikutest 42%, kiudainetest 2%
- Valgusisaldus 1,9 g/100 ml
- Ei sisalda gluteeni, piimavalgu, laktoosi, kristallisuhkrut ega fruktoosi

Kasutamishäidustused

- Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Dieetraviks raske lehmapiimavalgu allergia ja polüallergia korral
- Hüpoallergeenne
- Soodusravim: 0 - 12 kuud, 100%, K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2. 1 originaal = 6 purki

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

Kasutamine ja säilitamine


Valmistamisel järgida täpselt pakendil olevaid juhiseid. Reeglina kasutatakse valmistamiseks keedetud ja jahutatud vett (30 ml vett + 1 mõõtlusikatäis pulbrit (4,9 g)), raputada pudelit, kuni pulber on lahustunud. Valmis toitesegu kasutada kohe. Toitesegu, mis pudelis seisnud üle 1 tunni tuleb ära visata. Toidukorrast ülejäänud toitesegu ei tohi uuesti soojendada. Hoida kuivas ja jahedas. Juba avatud pakend sulgeda korralikult ja selle sisu kasutada ära 1 kuu jooksul.

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Rinnapiim on parim toit imikueas, see toidab, kaitseb ja arendab
- Toodet võib kasutada ainsa toitainetallikana alla 1 aasta vanuste laste toitmiseks

Sisaldab probiootikumi *Bifidobacterium breve* M-16V, mistõttu ei sobi kasutamiseks enneaegselt sündinud imikutele ja immuunpuudulikkusega imikutele. Ei soovitata. Kasutada, kui imikule on paigaldatud tsentraalveenikateeter, toidetakse postpüloorselt või on lapsel lühikese soole sündroom. Nendel juhtudel otsustab toitesegu sobivuse raviarst. Lapse seisundit tuleb nendel juhtudel ka väga hoolikalt jälgida.

SAMA SISU
uus välimus alates
detsembrist 2023



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	286 kJ/68 kcal
Rasvad (45 E%)	3,4 g
millest:	
küllastunud rh	1,5 g
MCT	1,1 g
monoküllastumata rh	1,3 g
polüküllastumata rh	0,55 g
millest:	
linoolhape	445 mg
alfa-linoleenhape	45 mg
arahidoonhape (AA)	17,1 mg
dokosaheksaeenhape (DHA)	17,1 mg
Süsivesikud (42 E%)	7,2 g
millest: suhkrud	0,67 g
Kiudained (2 E%)	0,64 g
Valgud (11 E%)	1,9 g
Sool	0,08 g

Muud	
Karotenoidid	1,37 mg
L-karnitiin	19 mg
Koliin	15,3 mg
Tauriin	4,4 mg
Nukleotiidid	2,39 mg
Osmolaarsus	360 mOsmol/kg H ₂ O

Vitamiinid	
A	59,7 µg RE
D ₃	1,64 µg
E	1,37 mg α-TE
C	7,31 mg
K	6,17 µg
Tiamiin	80 µg
Riboflaviin	80 µg
Niatsiin	0,57 mg
B ₆	70 µg
Foolhape	9,51 µg
Folaadid	15,8 µg DFE
B ₁₂	0,19 µg
Biotiin	2,66 µg
Pantoteenhape	0,42 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	30 mg
K	74,8 mg
Cl	54,4 mg
Ca	79,2 mg
P	51,5 mg
Mg	7,2 mg
Fe	1,02 mg
Zn	0,75 mg
Cu	58 µg
Mn	7 µg
Mo	14,3 µg
Se	1,57 µg
Cr	2,59 µg
I	1,5 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 400 g, 1 originaal = 6 purki





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,67 kcal/ml
- Vabadel aminohapetel baseeruv pulbriline täisväärtuslik toitesegu
- Energia osakaal valkudest 11%, rasvadest 47%, süsivesikutest 42%
- Valgusisaldus 1,8 g/100 ml
- Sisaldab LC PUFA't ja nukleotiide
- Ei sisalda gluteeni, piimavalgu, laktoosi, suhkrut ega fruktoosi

Kasutamisläbikäik

- Meditsiinilisel läbikäigul kasutamiseks ettenähtud toit. Dieetraviks raske lehmapiimavalgu allergia ja polüallergia korral
- Hüpoallergeenne

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Rinnapiim on parim toit imikueas, see toidab, kaitseb ja arendab
- Toode sobib ainsa toitainelikkana alla 1 aasta vanustele
- Soodusravim: 0 - 12 kuud, 100%, K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2. 1 originaal = 6 purki

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

Kasutamine ja säilitamine

Valmistamisel järgida täpselt pakendil olevaid juhiseid. Reeglina kasutatakse valmistamiseks keedetud ja jahutatud vett (30 ml vett + 1 mõõtlusikatais pulbrit (4,5 g)), raputada pudelit, kuni pulber on lahustunud. Valmis toitesegu kasutada kohe. Toitesegu, mis pudelis seisnud üle 1 tunni tuleb ära visata. Toidukorrast ülejäänud toitesegu ei tohi uuesti soojendada. Hoida kuivas ja jahedas. Juba avatud pakend sulgeda korralikult ja selle sisu kasutada ära 1 kuu jooksul.

SAMA SISU
uus välimus alates
detsembrist 2023



Toitumislane teave 100 ml tootes

Energia	278 kJ/67 kcal
Rasvad (46 E%)	3,5 g
millest:	
küllastunud rh	1,3 g
monoküllastumata rh	1,5 g
polüküllastumata rh	0,56 g
millest:	
linoolhape	453 mg
alfa-linoleenhape	45,6 mg
arahidoonhape (AA)	16,6 mg
dokosaheksaeenhape (DHA)	16,6 mg
Süsivesikud (43 E%)	7,1 g
millest: suhkrud	0,62 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (11 E%)	1,8 g
Sool	0,07 g

Muud	
Koliin	18,5 mg
Inositool	14,9 mg
Nukleotiidid	2,33 mg
L-karnitiin	1,33 mg
Tauriin	4,32 mg
Osmolaarsus	310 mOsmol/l
Osmolaalsus	340 mOsmol/kg H ₂ O

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 400 g purk,
1 originaal = 6 purki

Vitamiinid	
A	58,2 µg RE
D ₃	1,6 µg
E	1,33 mg α-TE
K	6,0 µg
Tiamiin	80 µg
Riboflaviin	80 µg
Niatsiin	1,27 mg
Pantoteenhape	0,41 mg
B ₆	60 µg
Foolhape	15,4 µg DFE
B ₁₂	0,19 µg
Biotiin	2,59 µg
C	7,11 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	29,3 mg
K	72,9 mg
Cl	53,0 mg
Ca	77,1 mg
P	50,2 mg
Mg	7,01 mg
Fe	1,0 mg
Zn	0,73 mg
Cu	57 µg
Mn	7 µg
Mo	1,53 µg
Se	2,53 µg
Cr	1,46 µg
I	14,0 µg





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1 kcal/ml
- Vabadel aminohapetel baseeruv pulbriline täisväärtuslik toitesegu
- Energia osakaal valkudest 11%, rasvadest 47%, süsivesikutest 42%
- Valgusisaldus 2,8 g/100 ml
- Sisaldab LC PUFA't ja nukleotiide
- Ei sisalda gluteeni, piimavalgu, laktoosi, kristallsuhkrut ega fruktoosi

Kasutamisläidustused

- Meditiiniisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Dieetraviks raske lehmapiimavalgu allergia ja polüallergia korral üle 1 aasta vanustele lastele
- Hüpoallergeenne

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Toode sobib ainsa toitaineallikana või osana päevasest toiduvalikust üle 1 aasta vanustele
- Soodusravim: 1 - 2 aasta vanustele lastele, 100%, L20.8; L27.2; K52.2; K90.4.
1 originaal = 6 purki

NB!

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks
- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele

Kasutamine ja säilitamine

Valmistamisel järgida täpselt pakendil olevaid juhiseid. Reeglina kasutatakse valmistamiseks keedetud ja jahutatud vett (30 ml vett + 1 mõõtlusikatais pulbrit (7,3g)), raputada pudelit, kuni pulber on lahustunud. Valmis toitesegu kasutada kohe. Toitesegu, mis pudelis seisnud üle 1 tunni tuleb ära visata. Toidukorrast ülejäänud toitesegu ei tohi uuesti soojendada. Hoida kuivas ja jahedas. Juba avatud pakend sulgeda korralikult ja selle sisu kasutada ära 1 kuu jooksul.

SAMA SISU
uus välimus alates
detsembrist 2023



Toitumislane teave 100 ml tootes

Energia	420 kJ/100 kcal
Rasvad (42 E%)	4,6 g
millest:	
küllastunud rh	2,0 g
monoküllastumata rh	1,6 g
polüküllastumata rh	0,84 g
Süsivesikud (47 E%)	11,8 g
millest: suhkrud	1,1 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (11 E%)	2,8 g
Sool	0,15 g

Muud	
Koliin	20,0 mg
Inositol	5,5 mg
L-karnitiin	3,3 mg
Tauriin	6,6 mg
Osmolaarsus	600 mOsmol/kg H ₂ O

Vitamiinid	
A	45,2 µg RE
D ₃	1,3 µg
E	1,4 mg α-TE
K	4,0 µg
Tiamiin	0,10 mg
Riboflaviin	0,20 mg
Niatsiin	1,9 mg NE
Pantoteenhape	0,40 mg
B ₆	0,10 mg
Foolhape	15,0 µg
B ₁₂	0,25 µg
Biotiin	3,0 µg
C	10,0 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	60,1 mg
K	115 mg
Cl	92,2 mg
Ca	90,3 mg
P	65,2 mg
Mg	14,0 mg
Fe	1,2 mg
Zn	1,1 mg
Cu	100 µg
Mn	0,06 mg
Mo	4,5 µg
Se	3,2 µg
Cr	1,6 µg
I	15,0 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitumisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 400 g, 1 originaal = 6 purki



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1 kcal/1 ml
- Pulbriline toitesegu
- Energia osakaal valkudest 8%, rasvadest 89%, süsivesikutest 2%, kiudainetest 1%
- Väga rasvarikas, väga madala süsivesikute sisaldusega
- Sisaldab piimavalgu, aminohapped, kiudained, pika ahelaga triglütseriide, dokosaheksaehapet (DHA) ja arahhidoonhapet (AA)

Kasutamisinäidustused

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Dieetraviks ravimiresistentse epilepsia ja muude juhtude korral, kui on näidustatud ketogeenne dieet.

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Toode sobib ainsa toitainelikkana 1 - 10 aasta vanustele lastele või osana päevasest toiduvalikust üle 10 aasta vanustele lastele ja täiskasvanutele
- Ketogeensel dieedil patsiente tuleb hoolikalt jälgida, et tagada eakohane kasvamine, adekvaatsed ainevahetusprotsessid ja vältida hüpoglükeemiat neerukivide teket ja hüperlipideemiat

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks
- Ei sobi imikutele (0 - 12 kuud)

Valmistamine ja säilitamine

Valada puhtasse nõusse keedetud ja jahutatud vesi (45 - 50°C) ja lisada ettenähtud kogus pulbrit. Soovitatud kontsentratsioon (14,3%) = 14,3 g pulbrit + 86 ml vett. Sulgeda ja loksutada, kuni pulber on täielikult lahustunud. Järgida hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid ja vajadusel steriliseeritud nõusid. Vajalik toidukogus valmistada alati vahetult enne toitmist ja toita kohe. Valmis lahust võib säilitada külmikus kuni 24 tundi. Kasutamata jäänud toitesegu jäägid tuleb ära visata.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	413 kJ/100 kcal
Rasvad (89 E%)	9,8 g
millest:	
küllastunud rh	3,7 g
monoküllastumata rh	3,2 g
polüküllastumata rh	2,9 g
arahidoonhape (AA)	17 mg
dokosaheksaehape (DHA)	15,6 mg
Süsivesikud (2 E%)	0,40 g
millest: suhkrud	0,10 g
Kiudained (1 E%)	0,77 g
Valgud (8 E%)	2,0 g
Sool	0,19 g

Muud	
Koliin	46 mg
Inositol	3,14 mg
L-karnitiin	6,39 mg
Tauriin	4,69 mg

Vitamiinid	
A	45,4 µg RE
D ₃	1,49 µg
E	1,66 mg α-TE
K	7,3 µg
Tiamiin	0,10 mg
Riboflaviin	0,12 mg
Niatsiin	1,51 mg-NE
Pantoteenhape	0,41 mg
B ₆	0,12 mg
Foolhape	16,5 µg
B ₁₂	0,18 µg
Biotiin	2,71 µg
C	8,52 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	75,2 mg
K	121 mg
Cl	114 mg
Ca	111 mg
P	65,6 mg
Mg	15,2 mg
Fe	1,14 mg
Zn	0,62 mg
Cu	78 µg
Mn	0,062 mg
Mo	4,5 µg
Se	4,26 µg
Cr	2,23 µg
I	12,2 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 300 g

Maitseid: vanilje ja neutraalse maitsega



KetoCal 3:1 neutral

Vanus: alates sünnist

Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,7 kcal/1 ml
- Pulbriline toitesegu
- Väga rasvarikas, väga madala süsivesikute sisaldusega
- Sisaldab piimaalku, aminohappeid, kiudaineid, pika ahelaga triglütseriide, dokosaheksaenhapet (DHA) ja arahidoonhapet (AA)

Kasutamisanäidustused

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit. Dieetraviks ravimiresistentsel epilepsia ja muude juhtude korral, kui on näidustatud ketogeenne dieet.

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Toode sobib ainsa toitainetallikana alates sünnist kuni 3 aasta vanustele lastele
- Ketogeenset dieedil patsiente tuleb hoolikalt jälgida, et tagada eakohane kasvamine, adekvaatsed ainevahetusprotsessid ja vältida hüpopoglukeemiat, neerukivide teket ja hüperlipideemiat

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks
- Ei sobi püruvaadi karboksülaasi defitsiidi, rasvhapete oksüdeerumishäirete, ketogeneesi/ketolüüsi defektide, mitokondriaalsete haiguste (välja arvatud NADH dehüdrogenaasi puudulikkus) ja raske maksahaiguse korral

Valmistamine ja säilitamine

Valada puhtasse nõusse keedetud ja jahutatud (45 - 50°C) vesi ja lisada ettenähtud kogus pulbrit. Soovitatud kontsentratsioon (14,3%) = 14,3 g pulbrit + 86 ml vett. Sulgeda ja loksutada, kuni pulber on täielikult lahustunud. Järgida hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid ja vajadusel steriliseeritud nõusid. Vajalik toidukogus valmistada alati vahetult enne toitmist ja toita kohe (kuni 1 tunni jooksul). Valmis toitelahust võib säilitada külmikus kuni 24 tundi. Kasutamata jäänud toitesegu jäägid tuleb ära visata.



Toitumisolane teave 100 ml tootes

Energia	273 kJ/66 kcal
Rasvad (87 E%)	6,4 g
millest:	
küllastunud rh	2,5 g
arahidoonhape (AA)	16,5 mg
dokosaheksaenhape (DHA)	16,5 mg
Süsivesikud (4 E%)	0,67 g
millest:	
suhkrud	0,50 g
laktoos	0,47 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (9 E%)	1,4 g
Sool	0,08 g

Muud	
L-karnitiin	4,54 mg
Koliin	20,9 mg
Tauriin	4,53 mg
Inositol	14,5 mg
Osmolaarsus	105 mOsmol/l

Vitamiinid	
A	36,2 µg RE
D	1,58 µg
E	0,84 mg α-TE
K	5,15 µg
Tiamiin	70 µg
Riboflaviin	70 µg
Niatsiin	0,46 mg
Pantoteenhape	0,56 mg
B6	70 µg
Foolhape	9,90 µg
Folaadid	16,5 µg DFE
B12	0,13 µg
Biotiin	1,32 µg
C	8,89 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	33,1 mg
K	85,6 mg
Cl	50,7 mg
Ca	75,3 mg
P	50,8 mg
Mg	7,27 mg
Fe	1,12 mg
Zn	0,79 mg
Cu	48 µg
Mn	13 µg
Mo	3,25 µg
Se	2,51 µg
Cr	2,7 µg
I	9,66 µg

Doseerimine

Vajaliku toidukoguse määrab arst või toitmisravispetsialist arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 300 g

Maitse: neutraalse maitsega





Toote iseloomustus

- Rasvaemulsioon
- Energiasisaldus – 4,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 0%, süsivesikutest 0%, rasvadest 100%, kiudainetest 0%
- Sisaldab MC rasvhappeid
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisinäidustused

- Rasva imendumishäiretega patsientidele
- Ketogeense dieedi korral

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25°C. Kasutamisel valmis. Enne kasutamist loksutada. Ettenähtud ööpäevane annus jagada mitme portsuna päeva peale ja manustada koos teiste toitudega. Lastele alla 5 aastat on soovitatav lahjendada. Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 14 päeva jooksul.



Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	1865 kJ/454 kcal
Rasvad (100 E%)	50,4 g
millest:	
küllastunud rasvhapped	50,4 g
MCT	49,1 g
MCT (%)	97,40%
LCT	1,3 g
LCT (%)	2,60%
Süsivesikud (0 E%)	0 g
millest: suhkrud	0 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (0 E%)	0 g
Sool	0,01 g

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	5,0 mg
Ca	1,0 mg

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele arvestades patsiendi vanust, kehakaalu ja tervislikku seisundit

Pakend: 250 ml plastpudel (originaal = 4 × 250 ml)

Maitseid: neutraalne



Flocare® Infinity™ enteraalse toitmise pump

Väike, kerge ja sobib nii portatiivseks kui voodi kõrval kasutamiseks.

Pump töötab korrektselt ja täpselt vaid juhul, kui toitmiseks kasutatakse selleks spetsiaalselt ette nähtud toitmissüsteeme.

Toote iseloomustus

- Pump töötab igas asendis
- Manustamiskiiruseks saab valida 1 - 400 ml/h sammuga 1 ml
- Annuseks saab valida 1 - 4000 ml sammuga 1 ml
- Pump töötab vooluvõrgus või liitium-ion akul
- Elektrikatkestuse korral lülitub pump automaatselt üle akutoitele
- Hästi loetav valgustatud LCD ekraan
- Probleemi korral – nii visuaalne kui ka akustiline alarm
- Veekindel – võib loputada voolava vee all
- Klamber pumba kinnitamiseks statiivi külge
- Võimalus ühendada patsiendi seiresüsteemiga (PDMS)

Peamised tehnilised andmed

- Manustamise täpsus $\pm 5,0\%$ juhul, kui pumba kasutatakse koos Flocare® Infinity™ enteraalse toitmise süsteemiga
- Oklusiooni avastamisrõhk:
Ülesvoolu oklusioon: -34 kPa (taluvus 21 kPa), Allavoolu oklusioon: 83 kPa (taluvus 21 kPa)
- Õhumullide avastamine: õhu kogus, mis peab õhu andurit läbima enne kui alarm aktiveerub, varieerub 0,5 - 1 ml-ni
- IPX 5: veepritsmekindel: ükskõik millisest suunast tulevad veejoad ei mõjuta pumba
- Toide: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz; 0,4 A max
- Aku: sisemine laetav liitium-ion aku, 3,6 V DC 2000 mAh
- Aku mahtuvus: 24 tundi kiirusel 125 ml/h


Mõõdud

140 x 95 x 35 mm

Kaal 392 g

Pumba osad

- A. Pumba kaas
- B. LCD ekraan
- C. Klaviatuur programmeerimiseks
- D. Rootor
- E. Sissevoolu rõhuandur
- F. Väljavoolu rõhuandur
- G. Kassett süsteemi sisestamiseks
- H. Õhuandur



Flocare® toitmissüsteem pudelile gravitatsioonimeetodil toitmiseks - ENFit


Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks plastpudelitest (125, 200, 500 ml ja 1000 ml) sondi kaudu gravitatsioonimeetodil. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. Otsik pudeliga ühendamiseks
- B. Õhufilter
- C. Tilgakamber
- D. Tilkumise kiiruse regulaator
- E. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- F. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- G. Kork süsteemi sulgemiseks
- H. Riputusaas

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne. Karbis 30 tk.



Flocare® toitmissüsteem spike otsikuga gravitatsioonimeetodil toitmiseks - ENFit


Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks spikeühendusega pehmetest plastpudelitest gravitatsioonimeetodil. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. Spike otsik ühendamiseks sonditoidu pakendiga
- B. Tilgakamber
- C. Tilkumise kiiruse regulaator
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- F. Kork spike otsikule
- G. Kork süsteemi sulgemiseks

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Karbis 30 tk.



Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbaga toitmiseks pudelist - ENFit


Enteraalne toitmissüsteem Infinity pumbaga toitmiseks on ette nähtud sonditoidu manustamiseks plastpudelitest (125, 200, 500 ml ja 1000 ml). Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. Otsik ühendamiseks pudeliga
- B. Tilgakamber
- C. Ühendus Flocare Infinity pumbaga
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. Enfit otsik sondiga ühendamiseks
- F. Kork süsteemi sulgemiseks
- G. Riputusaas

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Karbis 30 tk.



Flocare® Infinity™ toitmissüsteem spike otsikuga pumbaga toitmiseks - ENFit


Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks spikeühendusega pehmetest plastpudelitest toitmispumbaga. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. Spike otsik ühendamiseks pehme plastpudeliga
- B. Tilgakamber
- C. Ühendus Flocare Infinity pumbaga
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. ENFit otsik sondiga ühendamiseks
- F. Kork süsteemi sulgemiseks
- G. Kork spike otsikule

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Karbis 30 tk.



Flocare® PEG Set - ENFit

PEG gastrostoomi sond ENFit otsikuga makku toitmiseks.
Flocare® perkutaanne endoskoopiline gastrostoomi (PEG) rajamise komplekt – "pull" meetodil endoskoobi abil paigaldatav gastrostoom.

Toote iseloomustus

- Paigaldamiseks ei ole vaja kasutada üldnarkoosi ega avada kõhuõõnt
- Valmistatud pehmest ja poolläbipaistvast polüüretaanist, mis tagab patsiendile mugava toidu manustamise
- Sondi röntgenkontrastsus võimaldab kontrollida sondi asukohta
- Hüdromeerne kate ja jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust ja asukohta
- Väline silikoonist fikseerimisplaat on patsiendile mugav ja võimaldab naha hooldamist stoomi ümber
- Läbivoolu reguleerimisklamber, takistab toidu ja maosisu tagasivoolu
- ENFit otsik ühendamiseks toitmissüsteemiga

Kasutamisinidustused

Flocare® PEG- i paigaldamine on näidustatud, kui patsienti on plaanis toita sondi kaudu pikemaajaliselt (üle 30 päeva). PEG-i kaudu toitmine on patsiendile mugavam ja põhjustab vähem komplikatsioone võrreldes nasogastraalsondi pikemaajalise kasutamisega.

Suurused (läbimõõt/pikkus)

- Ch 10 / 40 cm
- Ch 14 / 40 cm
- Ch 18 / 40 cm

Pakend

Iga PEG on eraldi pakendis. Sisu on steriilne, kui pakend ei ole avatud või kahjustatud.

Komplekti osad

- ENFit otsik –
Ch 10 (must),
Ch 14 (roheline),
Ch 18 (punane)
- Läbipaistev röntgenkontrastne polüüretaansond, mis sobib Ch (10, 14 või 18) otsikuga. Sondi pikkus - 40 cm
- Voolu reguleerimise klamber
- Fikseerimisklamber
- Väline silikoonist fikseerimisplaat sondi fikseerimiseks kõhule
- Sisemine silikoonist fikseerimisplaat
- Ühekordne skalpell
- Punktsiooninõel
- Tamiil koos hoidikuga



Flocare® PEG otsik - ENFit

Flocare® PEG otsik – ENFit otsik turvaliseks ühendamiseks toitmisüsteemiga/süstlaga. See on ette nähtud kasutamiseks juhul, kui muidu kasutamiskõlbliku PEG-I otsik on purunenud.

Saadaolevad surused (diameter)

- Ch 10
- Ch 14
- Ch 18

Pakend

Iga otsik on eraldi pakendis.

Sisu on steriilne, kui pakend ei ole avatud või kahjustatud.

Karbis on 10 tk.



Flocare® Infinity™ toitmissüsteem 1,3 L reservuaariga toitmiseks toitmispuhaga

Enteraalne toitmissüsteem Infinity pumbaga toitmiseks on ette nähtud sonditoidu manustamiseks 1,3 liitrisest reservuaarist. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- B. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- C. Ühendus Flocare® Infinity™ pumbaga
- D. Kork

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Karbis 30 tk.



Flocare® balloongastrostoom

Silikoonist ballooniga gastrostoomi sond enteraalseks toitmiseks makku. Paigaldatakse juba formeerunud gastrostoomikanalisse eelmise sondi asendamiseks või operatsiooni ajal. Balloongastrostoomi ühendamiseks soovitatakse kasutada Flocare® toitmissüsteeme.

Toote iseloomustus

- Valmistatud läbipaistvast silikoonist
- Paigaldamiseks ja asendamiseks ei ole vaja teostada endoskoopiat
- Sondi vahetus on võimalik ka kodustes tingimustes
- Jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust ja asukohta
- Makku jääva sondi osa on röntgenkontrastne
- Kaks lisaava sondi tipus aitavad vähendada ummistumist
- Väline silikoonist fikseerimisplaat on patsiendile mugav ja võimaldab hooldada nahka stoomi ümbruses
- Sondi välimises otsas on kaks porti: toitmiseks ja ballooni täitmiseks veega

Kasutamisinidustused

Flocare® balloongastrostoomi paigaldamine on näidustatud, kui patsienti on plaanis toita sondi kaudu pikemaajaliselt (üle 30 päeva) või kui on vaja asendada PEG sond.

Suurused

(läbimõõt/pikkus/ballooni mahu järgi)

- Ch 14 / 23 cm. Balloon - 5 ml
- Ch 18 / 23 cm. Balloon - 15 ml
- Ch 20 / 23 cm. Balloon - 15 ml

Pakend

Iga balloongastrostoomi sond on eraldi pakendis. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Balloongastrostoomi osad

- A. Port ballooni täitmiseks
- B. Port toidu manustamiseks (otsikust moodustub kork sondi sulgemiseks)
- C. Läbipaistev silikoonsond jaotusmärkidega (cm). Sondi pikkus - 23 cm
- D. Väline silikoonist sondi fikseerimisplaat, mis võimaldab sondi fikseerida kõhule
- E. Silikoonballoon ja sisemine fiksaator, röntgenkontrastne
- F. Läbivoolu reguleerimisklamber, takistab toidu ja maosisu tagasivoolu



Flocare® PUR toitmissond - ENFit

ENFit otsikuga polüuretaanist nasogastraalsond enteraalseks toitmiseks makku. Ohutu, kerge paigaldada, peenike. Vahetada 42 päeva/6 nädala järel. Sond sobib kokku Flocare® enteraalsete toitmissüsteemidega.

Toote omadused

- Valmistatud pehmest, läbipaistvast polüuretaanist, mis on patsiendile mugav ja mis kohandub söögitoru kujuga
- Vajab vahetamist 6 nädala järel. Ka pikaajalisel kasutamisel ei muutu jäigaks
- Jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust
- Juhtetraat lihtsustab paigaldamist
- Röntgenkontrastne joon aitab kontrollida sondi asukohta
- Sondi tipus kaks külgmist lisaava, mis aitab vähendada ummistumist
- ENFit otsik ühendamiseks enteraalse toitmissüsteemiga

Kasutamisinäidustused

Flocare® PUR sondi kasutatakse patsientide lühiajaliseks (kuni 6 nädalat) enteraalseks toitmiseks.

Suurused (läbimõõt/pikkus)


- Ch 5 / 40 cm (ilma juhtetraadita)
 - Ch 6 / 60 cm
 - Ch 8 / 110 cm
 - Ch 10 / 110 cm
 - Ch 12 / 110 cm
- 110 cm pikkused sondid on täiskasvanute toitmiseks, 60 cm pikkune sond on imikutele ja lastele.

Pakend

Iga sond on pakendatud eraldi steriilsesse pakendisse. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne. Ühes karbis 10 sondi.

Sondi koostisosad

- A. ENFit, mis ühildub toitmissüsteemiga
- B. Läbipaistev polüuretaanist sond helesinise röntgenkontrastse triibuga ja cm mõõdestikuga
- C. Kaks külgmist ava sondi lõpuosas ja üks sondi tipus
- D. Silikooniga kaetud ümara otsaga juhtetraat



Flocare® pikendusliin, 100 cm


Pikendusliin (100 cm) on ette nähtud Flocare® toitmissüsteemi pikendamiseks. See annab patsiendile suurema liikuvuse ja lihtsustab hooldamist. Ohutu ühendada teiste ENFit süsteemidega.

Suurused

- 100 cm

Pakend

Pikendusliin on pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne. Ühes karbis 40 pikendusliini.



ENFit lahusekõrs, 100 mm

ENFit lahusekõrs vee, ravimite, muude enteriaalselt manustatavate lahuste tõmbamiseks süstlasse

Suurused

- 100 mm

Pakend

Kõrs on pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Ühes karbis 30 kõrt.



Madalaprofiilne balloongastrostoom (nööp)

Läbipaistev silikoonist madalaprofiilne balloongastrostoom. Nahale jääv plaat on väga väike. Paigaldatakse läbi juba moodustunud gastrostoomiava ja ei vaja korduvat endoskoopiat. Fikseerimine seestpoolt ballooniga, mis täidetakse 5 ml steriilse veega. Mugav hooldada ja puhastada nii stoomiava kui ka nööpi. Kosmeetiliselt parim lahendus. Paraneb patsiendi liikumisvabadus.

Mõõdud

- Ch 12 / 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm
- Ch 14 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 16 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 18 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm
- Ch 20 / 0,8 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 24 / 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 5,0 cm



Flocare® balloongastrostoomi pikendusliin (toitmissüsteem)


Flocare® pikendusliine kasutatakse nööbi ohutuks ühendamiseks toitmissüsteemi/süstlaga ja toidu manustamiseks.

Suurused

- 30 cm
- 60 cm

Pakend

Pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.
5 tk. karbis



Flocare® ENFit enteraalsed toitmissüstlad

Enteraalsed toitmissüstlad ENFit otsikuga ravimite manustamiseks, toidu manustamiseks boolusena ja sondi loputamiseks veega. Süstal on ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil.

Suurused

- 2,5 ml – ravimite manustamiseks
- 10 ml – ravimite manustamiseks
- 20 ml – ravimite manustamiseks
- 60 ml – toidu manustamiseks

Pakend

Iga süstal on eraldi pakendis

2,5 ml – 600 tk. karbis

10 ml – 30 tk. karbis

20 ml – 30 tk. karbis

60 ml – 30 tk. karbis

Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.



Flocare® boolusadapter

Flocare® boolusadapter toidu süstlasse tõmbamiseks ohutult ja hügieeniliselt.

Pakend

Pakendatud ühe kaupa.

Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.



Flocare® ENFit kahe spikega vaheühendus

Kasutamine

Y-adapter 2 toitmissüsteemi korraga ühendamiseks.

Ühekordseks kasutamiseks.

Vahetada iga 24 tunni järgselt.

Pakend

Pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.

Avamata ja terve pakend on steriilne.

30 tk. karbis

