

ENTERAALSETE RAVITOITUDE JA TOITMISTARVIKUTE KATALOOG

Informatsioon ainult meditsiinitöötajatele.



NutriMedical OÜ
Türi 3, 11313 Tallinn
E-mail: info@nutrimedical.ee
www.nutricia.ee • <https://ravitoit.ee/>

2026

Mõisted	3
Toitmisravi näidustused	4
Haiguspuhuse alatoitumusriski ja toitumuse hindamine	4
Toitmisravi alustamise kriteeriumid	5
Energiavajaduse arvestamine	5
Koduse enteraalse toitmisravi korraldus Eestis (lastele ja täiskasvanutele)	6
Enteraalse toitmisravi alustamine ja läbiviimine	8
Toitmisravi meetodi valiku skeem	10

Nutrison	11
Nutrison Multi Fibre	12
Nutrison Energy	13
Nutrison Energy Multi Fibre	14
Nutrison 1000 Complete Multi Fibre	15
Nutrison advanced Cubison	16
Nutrison advanced Dison Energy HP	17
Nutrison advanced Peptisorb	18
Nutrison Protein Plus	19
Nutrison Protein Advance	20
Nutrison Protein Intense	21
Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre	22
Nutrison PlantBased HP Multi Fibre	23
Nutrison Powder	24

Teave uuendustest!	25
Nutridrink® / Nutridrink® Compact	26
Nutridrink® Protein / Nutridrink® Compact Protein	27
Nutridrink® Compact Protein Sensations	28
Nutridrink® Protein Omega 3	29
Nutridrink® PlantBased 1.5	30
Nutridrink® PlantBased Protein 2.0	31
Nutridrink® Multi Fibre / Nutridrink® Compact Fibre	32
Nutridrink® Jucy Plus	33

Diasip	34
Cubitan	35
Renilon 4.0	36
Renilon 7.5	37
Souvenaid	38
preOp	39
Calogen	40
Protifar	41
Stimulance	42
Nutilis	43
Nutilis Clear	44

Flocare® Infinity™ III enteraalse toitmise pump	45
Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbale; 40 mm korgile - ENFit	46
Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbale; spike ENFit	47
Flocare® Infinity™ toitmissüsteem 1,3 L mahutiga pumbale, ENFit	48
Flocare® Infinity™ universaalne toitmispumba raam	49
Flocare® toitmissüsteem gravitatsioonimeetodil toitmiseks 40mm korgile ENFit	50
Flocare® toitmissüsteem gravitatsioonimeetodil toitmiseks; spike ENFit	51
Flocare® toitmissüsteem 1,3 L reservuaariga gravitatsioonimeetodil toitmiseks	52
Flocare® ENFit kahe spikega vaheühendus	53
Flocare® PEG Set - ENFit	54
Flocare® Benchmark PEG/J sond kasutamiseks koos Flocare® PEG CH 18-ga	55
Flocare® PEG otsik - ENFit	56
Flocare® G-tube balloongastrostoom	57
Flocare® PUR toitmissond - ENFit	58
Flocare® pikendusliin, 100 cm	59
ENFit lahusekõrs, 100 mm	60
Madalaprofilne balloongastrostoom (nööp)	61
Flocare® balloongastrostoomi pikendusliin (toitmissüsteem)	62
Flocare® ENFit enteraalsed toitmissüstlad	63
Flocare® booluskonnektor	64



Toitmisravi

Toitmisravi on meditsiiniline sekkumine, mis hõlmab:

- haiguspuhuse alatoitumusriski ja toitumuse hindamist,
- energia- ja toitaineliste vajaduste hindamist ja arvestamist,
- sobiva toitmisravi meetodi valikut ning vajaliku energia- ja toitainete pakkumise tagamist suukaudselt, enteraalselt või parenteraalselt,
- ravi jälgimist.

Toitmisravi eesmärk on toitumuse parandamine ja/või säilitamine patsientidel, kellel ei ole tavatoiduga võimalik saavutada oma vajadustele vastavat energia- ja toitainete saamist või omastamist.

Toitmisravi alla kuuluvad:

- suukaudne toitmisravi, sh suukaudsed toitmisravi preparaadid^{**},
- enteraalne toitmisravi sondi või stoomi kaudu, kasutades selleks spetsiaalseid enteraalseid toitelahuseid,
- parenteraalne toitmisravi veenitee kaudu^{**}.

Enteraalne toitmisravi

Enteraalne toitmine on energia, valkude, elektrolüütide, vitamiinide, mikroelementide ja vedeliku manustamine seedetrakti kaudu, kasutades selleks spetsiaalseid tööstuslikult toodetud toitelahuseid.

Enteraalset toitmisravi võib läbi viia toitesondi või -stoomi kaudu (näiteks nasogastraal-, jejunaalsondi, gastrostoomi või gastrojejunostoomi kaudu).

Enteraalseks toitmiseks kasutatakse spetsiaalselt toodetud enteraalseid toitelahuseid, mis tagavad tasakaalustatud toitainete saamise.

Toitmisravis kasutatakse:

- suukaudseid toitmisravi preparaate (STP), ingl k oral nutritional supplement (ONS)
- enteraalseid toitmisravi preparaate (ka enteraalsed toitelahused; kõnekeeles sonditoit, ingl k tube feed),
- parenteraalseid toitmisravi toitelahuseid.

* Suukaudse toitmisravi preparaadi (STP) all mõeldakse meditsiinilisel näidustusel kasutatavat suukaudset toitmisravi preparaati; inglise keeles oral nutritional supplement (ONS).

** Cederholm T *et al.* ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36:49-64.

Toitmisravi näidustused

Kes vajavad enteraalset toitmisravi?

Enteraalset toitmist võivad vajavad patsiendid:

- ① kellel on haiguspuhune alatoitumus või suur alatoitumusrisk,
- ② kelle suukaudne söömine ei ole ohutu või piisav või ei taga see vajadustele vastavat energia- ja toitainete saamist eeldatavasti üle 7 päeva,
- ③ kellel on toimiv seedetrakt ja kes on selle toitmisviisiga nõus.

Enteraalse või parenteraalse toitmise alustamine sõltub NELJAST kriteeriumist.

- Kui on ette teada, et vajadustele vastav energia- ja toitainete saamine suu kaudu on häiritud, tuleb hinnata toitmisravi alustamise vajadust. Toitmisraviga alustamise ajastus sõltub vähenenud suukaudse söömise kestusest, patsiendi toitumusest ja haiguskoormusest.
- Patsiendi toitumus. Alatoitumuses või suure alatoitumusriskiga patsiendid võivad vajada varasemat toitmisraviga alustamist.
- Haiguskoormus ja suurenenud toitumuslikud vajadused. Suure haiguskoormuse korral võib olla vajadus alustada toitmisraviga varem.
- Eriolud: põletik ja haiguskoormus ägeda või kroonilise vigastuse või haiguse tõttu, suurendavad toitumuslikke vajadusi (nt raske infektsioon, põletused, trauma).

Metaboolse stressi (hüperkatabolismi) tunnused: tahtmatu kehakaalu langus, ülemäärane lämmastiku kadu (ületades selle manustamist), suur lämmastiku kadu uriiniga.

Haiguspuhuse alatoitumusriski ja toitumuse hindamine

Alatoitumusriskiga või alatoitumuses patsientide väljaselgitamine


1. etapp. Alatoitumusriski hindamine.

See on kiire ja lihtne moodus alatoitumusriskiga või alatoitumuses patsientide väljaselgitamiseks. Alatoitumusriski sõelumiseks kasutatakse valideeritud hindamisvahendeid, näiteks NRS-2002, MUST või MNA-lühitest.

2. etapp. Toitumuse hindamine.


Toitumuse hindamine annab detailise ülevaate patsiendi toitumusest. Patsiendi haiglast väljakirjutamisel või teise asutusse suunamisel peab dokumentatsioon sisaldama järgmist teavet:

- toitumus käesoleval hetkel, kehamassiindeks (KMI) ja toitumuse muutus dünaamikas (minimaalselt kehakaal vastuvõtmisel ja väljakirjutamisel,
- rakendatud toitmisravi meetod ja kasutatud preparaatide kogused (suukaudselt, enteraalselt või parenteraalselt),
- biokeemilised ja/või kliinilised näitajad.



Toitmisravi alustamise kriteeriumid

Toitmisravi on oluline osa patsiendi terviklikust ravist. Ainevahetus, toitainete kasutamine, vereringe ja gaasidevahetus on omavahel seotud.



Energiavajaduse arvestamine

Lähtutakse põhienergiakulust (BEE, ingl k basic energy expenditure), mis arvutatakse Harris-Benedict valemi abil ja korrutatakse füüsilise aktiivsuse koefitsiendiga 1,1 - 1,3 ning vajaduse korral haigusest tingitud lisanduva energiakuluga.

Ligikaudse tulemuse saamiseks kasutatakse lihtsustatud valemite ehk nn. "rusikareeglit":

- **lamav patsient** 20 - 25 kcal/kg/päevas,
- **liikuv patsient** 25 - 35 kcal/kg/päevas.

Madala kehakaaluga, kuid metaboolselt stabiilsele patsiendile võib kehakaalu languse korral toitumuse parandamiseks anda arvutatust rohkem energiat ja toitaineid (näiteks plaanilise operatsiooni eelses perioodis).

Põhjalikud juhised leitavad:

<https://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines>

NB!

Kehakaalu ja/või lihasmassi suurendamise eesmärgil ning ületoitmisest tingitud tüsistuste vältimiseks on soovitatav suurendada patsiendi füüsilist aktiivsust vastavalt tema seisundile.

Energia- ja toitainete vajaduste arvestamisel tuleb lähtuda piisavalt hüdreeritud patsiendi tegelikust kehakaalust.

Erandid:

Rasvunud patsiendil (KMI 30 kg/m²) arvestatakse energia- ja toitainete vajadused ideaalse, mitte tegeliku kehakaalu järgi.

Kahheksiaga (KMI 16 kg/m²), raske alatoitumusega või mitu päeva järjest söömata olnud patsiendil alustatakse toitmist väikeste kogustega (maksimaalselt 50 % arvestatud kogusest tegeliku kehekaalu kohta), suurendades kogust järk-järgult.

HOIATUS!

Kahheksiaga või raske alatoitumusega patsiendi toitmise alustamisel tuleb olla ettevaatlik ning kontrollida fosfaadi ja kaaliumi taset veres, sest neil patsientidel on suur toitmise taasalustamise sündroomi risk (ingl k refeeding syndrome).

Koduse enteraalse toitmise ravi korraldus Eestis (lastele ja täiskasvanutele)

Kodune enteraalne toitmise ravi tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus.

- Enteraalse toitmise ravi päeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus	Kood	Piirhind (EUR)	Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%)	Kindlustatud isiku omaosaluse määr (%)
Enteraalne toitmise ravi boolusena	7037	14,10	100	0
Enteraalne toitmise ravi püsiinfusioonina	7038	26,45	100	0
Enteraalne toitelaht 1000 kcal (kodusel ravil)	7039	3,65	50	50
Enteraalne toitelaht 1000 kcal (statsionaarsel ravil)	7029	1,11	100	0

- **Näidustused.** Tervisekassa võtab koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud toitelahtuse manustamine sondi või stoomi kaudu, kuna suukaudsel tavatoidu söömisel pole tal võimalik saavutada vajadustele vastavat toitainete pakkumist ja/või toitainete omastamist järgmiste seisundite tõttu:

- ① pahaloomulise kasvaja haigusega kaasnev neelamishäire või alatoitumusrisk;
- ② neelamishäired lihas- ja/või närvisüsteemi haiguse või kahjustuse korral;
- ③ imendumishäirega seedetrakti haigus, väärarend või kahjustus;
- ④ kaasasündinud ainevahetushäire või ebaselge kasvupeetus.

- Koodiga 7039 tähistatud tervishoiuteenuse puhul on ravi alustamise otsuse teinud vähemalt üks toitmise ravi täiendkoolituse kehtivat sertifikaati omav spetsialist ja vähemalt üks arst.

- Koodidega 7037, 7038 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuste puhul on ravi alustamise otsuse teinud raviarst ning hiljemalt seitsmendaks ravipäevaks on individuaalse raviplaani koostanud vähemalt üks toitmise ravi täiendkoolituse kehtivat sertifikaati omav spetsialist ja vähemalt üks arst.
- Koodidega 7037 ja 7038 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad enteraalseks toitmiseks vajalike ühekordsete tarvikute kulu, patsiendi halduse kulu ning toitesegude, seadmete ja tarvikute kohaletoimetamise kulu ühe ravipäeva kohta.
- Koodiga 7038 tähistatud teenust rakendatakse ravipäeva kohta juhul, kui enteraalseks toitmiseks kasutatakse püsiinfusiooni pumpa.
- Koodiga 7037 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel statsionaarsel ravil viibivale patsiendile rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,9.
- Koodiga 7038 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel statsionaarsel ravil viibivale patsiendile rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,8.
- Koodidega 7039 ja 7029 tähistatud teenuseid rakendatakse koos koodiga 7037 või 7038 tähistatud tervishoiuteenusega ööpäeva kohta vastavalt patsiendi toitmise ravi preparaadist saadavale toiduenergiele alates 1000 kcal-st.
- Koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata koos koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenustega (I-IIIa astme intensiivravi).

Koduse enteraalse toitmise korraldus Eestis (lastele ja täiskasvanutele)

Suukaudsed toitmise preparaadid tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus.

Tervishoiuteenuse nimetus	Kood	Piirhind (EUR)	Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%)	Kindlustatud isiku omaosaluse määr (%)
Suukaudne standardne täisväärtuslik toitmise preparaat 600 kcal (kodusel ravil)	7090	7,10	75 või 100*	25 või 0*
Suukaudne standardne täisväärtuslik toitmise preparaat 600 kcal (stационаarsel ravil)	7091	4,03	100	0
Kohandatud koostisega täisväärtuslik toitmise preparaat 600 kcal (kodusel ravil)	7092	39,57	75 või 100*	25 või 0*
Kohandatud koostisega täisväärtuslik toitmise preparaat 600 kcal (stационаarsel ravil)	7093	40,16	100	0
Suukaudne kohandatud koostisega mittetäisväärtuslik toitmise preparaat tavatoidu tõhustamiseks 600 kcal (kodusel ravil)	7094	8,90	75 või 100*	25 või 0*
Suukaudne kohandatud koostisega mittetäisväärtuslik toitmise preparaat tavatoidu tõhustamiseks 600 kcal (stационаarsel ravil)	7095	6,91	100	0

- Rakendatakse päriliku ainevahetushaiguse või ravimrefraktaarse epilepsia korral.
Tervisekassa võtab nimetatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle:
 - päriliku ainevahetushaigusega,
 - seedetrakti kaasasündinud või omandatud puudulikkusega,
 - söögitoru ahenemisega,
 - põletikulise soolehaigusega või,
 - ravimrefraktaarse epilepsiaga patsiendilt,
 - juhul, kui patsiendil on säilinud suukaudse söömise võime ja/või tema seedetrakt on vähemalt osaliselt toimiv.

LISAINFO:

<https://www.estspen.ee/2023/01/02/uued-haigekassa-poolt-rahastatud-toitmise-teenused-haigekassa-loetelus/>

*** Allikas: Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu, RT I, 26.03.2026, 15, redaktsiooni jõustumine 01.04.2026.

Enteraalse toitmise ravi alustamine ja läbiviimine

Toitmise ravi läbiviimine ja toitude manustamine

- 1 Igal individuaalsel juhul tuleb valida kõige ohutum ja efektiivsem enteraalne toitmise meetod, et tagada patsiendile vajalik energia- ja toitainete saamine.
- 2 Kui seedetrakt on toimiv, tuleb eelistada enteraalset toitmise ravi.
- 3 Minimaalne enteraalne toitmise on soovitatav ka juhul, kui patsienti ei ole pikema aja jooksul võimalik toita ainult seedetrakti kaudu, sest enteraalset toitmist ei piisa või selleks esinevad vastunäidustused.
- 4 Juhul kui patsienti on võimalik toita enteraalset, kuid enteraalne toitmise ei kata kogu energia- ja toitainete vajadust, tuleb enteraalset toitmist täiendada parenteraalse toitmisega. Parenteraalset toitmist kasutatakse seni, kuni enteraalne toit katab ära vähemalt 60 % toitainete vajadusest.
- 5 Sõltuvalt patsiendi seisundist ja vajadusest võib toitmise ravi toimuda samaaegselt parenteraalselt ning enteraalset või suukaudselt.

Täiskasvanute energia- ja toitainelised vajadused

- **Valgud:** 0,8 - 1,5 g/kg ideaalse kehakaalu kohta/ööpäevas (või 10 - 20 % päevasest energiast) **
- **Energia:** 20 - 25 kcal/kg ideaalse kehakaalu kohta/ööpäevas*
- **Elektrolüüdid:** kliinilisest seisundist sõltuvalt, enamasti: naatrium 0,5 - 1,5 mmol/kg/ööpäevas, kaalium 0,3 - 1 mmol/kg/ööpäevas, kaltsium 0,3 - 0,5 mmol/kg/ööpäevas, magneesium 0,1 mmol/kg/ööpäevas, fosfaadid 0,7 - 1 mmol/kg/ööpäevas*
- **Vitamiinid ja mikroelemendid:** tavaline põhivajadus
- **Vedelik:** 20-40 ml/kg/ööpäevas*

Ideaalse kehakaalu arvutamine:

Mehed: $\text{kg} = 48 + (\text{pikkus (cm)} - 152) \times 1,06$

Naised: $\text{kg} = 45 + (\text{pikkus (cm)} - 152) \times 0,91$

Toitmise ravi alustamine

Enteraalse toitmise ravi alustamise skeem makku toitmise korral.

1. päev

KELLAAEG	8-12	12-14	14-15	15-19	19-21	21-22	22-1	1-7	7-8
Tunnid	4h	2h	1h	4h	2h	1h	3h	6h	1h
Manustamis-kiirus	50 ml/h	paus	Jäägi kontroll	80 ml/h*	paus	Jäägi kontroll	100 ml/h*	paus	Jäägi kontroll
Toitelahuse energia sisaldus	1 kcal/ml			1 kcal/ml			1 kcal/ml		
Saadav energia	200			320			300		

*sõltuvalt maojäägist

Enteraalse toitmise ravi skeem soolde toitmise korral

ÖÖPÄEV	I ööp	II ööp	III ööp	IV ööp	V ööp
Manustamis-kiirus*	10-20 ml/h	30-40 ml/h	50-60 ml/h	70-80 ml/h	90-100 ml/h
Toitelahuse energiasisaldus	1 kcal/ml	1 kcal/ml	1 kcal/ml	1 kcal/ml	1 kcal/ml
Manustamise aeg	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Ööpäevane energia saamine (kcal)	240-480	720-960	1200-1440	1680-1920	2160-2400

*kiirust suurendada iga 12 tunni järel 10 ml/h, juhul kui taluvus on hea

Enteraalse toitmise ravi alustamine ja läbiviimine

Toitelahuse manustamine erineva tilkumiskiirusega

1 liitri toitelahuse manustamiseks kuluv aeg	Manustamiskiirus	Tilkade arv
24 tundi	42 ml/h	14 tilka/min
20 tundi	50 ml/h	17 tilka/min
12 tundi	83 ml/h	28 tilka/min
10 tundi	100 ml/h	33 tilka/min
8 tundi	125 ml/h	42 tilka/min
6 tundi	167 ml/h	56 tilka/min
20 tilka on umbes 1 ml		

Valgu- ja energiavajadus

Seisund	Valgud	Energia
Kriitiliselt haige patsient ^{1,2}	1,3 g/kg/ööpäevas	haiguse algfaasis 20 - 25 kcal/kg/ööpäevas tervenemisaasis 25 - 30 kcal/kg/ööpäevas
Kasvajalise haigusega patsient ³	1 - 1,5 g/kg/ööpäevas	25 - 30 kcal/kg/ööpäevas
Eakas patsient ⁴	>1,0 g/kg/ööpäevas	25 - 30 kcal/kg/ööpäevas

¹ Singer P *et al.* ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023;42:1671-1689.


² Kreymann KG *et al.* ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition).

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006;25:210-23.

³ Muscaritoli M *et al.* Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40:2898-2913.

⁴ Volkert D *et al.* ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019;38:10-47.

Toitmisravi meetodi valiku skeem





Standardne toitelahus

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvadest 35 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamised

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

Kasutamishüpsid

Pakendi ühendamisest asepsilisel toitmissüsteemiga (suletud süsteem) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

Toitumistalane teave 100 ml tootes

Energia	420 kJ/100 kcal
Rasvad (35 E%)	3,9 g
millest: küllastunud rh	0,48 g
monoküllastumata rh	2,1 g
polüküllastumata rh	1,3 g
dokosaheksaehape (DHA)	13,4 mg
eikosapentaehape (EPA)	19,6 mg
Süsivesikud (49 E%)	12,4 g
millest: suhkrud	0,81 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	<0,1 g
Valgud (16 E%)	4,0 g
Sool	0,23 g

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D3	1,7 µg
E	1,3 mg α-TE/ET
K	8 µg
Tiamiin	0,2 mg
Riboflaviin	0,3 mg
Niatsiin	1,81 mg NE/EN
Pantoteenhape	0,42 mg
B6	0,3 mg
Foolhape	24 µg
B12	0,4 µg
Biotiin	3 µg
C	13 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	90 mg
K	150 mg
Cl	120 mg
Ca	80 mg
P	60 mg
PO4	184 mg
Mg	21 mg
Fe	1,6 mg
Zn	1 mg
Cu	0,15 mg
Mn	0,15 mg
F	0,12 mg
Mo	11 µg
Se	5,7 µg
Cr	6 µg
I	14 µg

Muud	
Karotenoidid	0,20 mg
Koliin	37 mg
Osmolaarsus	270 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	85 ml

500 ml

Tootekood: 101020

1000 ml

Tootekood: 101007

NUTRICIA

Nutrison Multi Fibre

1,0 kcal/ml



Standardne toitelahus kiudainetega

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisevalmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,03 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 47 %, rasvadest 34 %, kiudainetest 3 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 – 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamiskiirustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaoasas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral

Kasutamiskiirused

Pakendi ühendamisest aseptiliselt toitmissüsteemiga (suletud süsteem) on pudeli statiiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

Toitumistalane teave 100 ml tootes

Energia	430 kJ/103 kcal
Rasvad (34 E%)	3,9 g
millist: küllastunud rh	0,48 g
monoküllastumata rh	2,1 g
polüküllastumata rh	1,3 g
dokosaheksaeenhape (DHA)	13,8 mg
eikosapentaenehape (EPA)	20,2 mg
Süsivesikud (47 E%)	12,3 g
millist: suhkru	0,88 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (3 E%)	1,5 g
Valgud (16 E%)	4,0 g
Sool	0,22 g

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D3	1,7 µg
E	1,3 mg α-TE
K	8 µg
Tiamiin	0,2 mg
Riboflaviin	0,3 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,42 mg
B6	0,3 mg
Foolhape	24 µg
B12	0,4 µg
Biotiin	3 µg
C	13 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	90 mg
K	150 mg
Cl	120 mg
Ca	80 mg
P	80 mg
PO4	184 mg
Mg	21 mg
Fe	1,6 mg
Zn	1 mg
Cu	0,15 mg
Mn	0,15 mg
F	0,11 mg
Mo	11 µg
Se	5,7 µg
Cr	6 µg
I	14 µg

Muud	
Karotenoidid	0,20 mg
Koliin	37 mg
Osmolaarsus	270 mOsmol/l
Vesi (H2O)	84 ml

500 ml
Tootekood: 101019

1000 ml
Tootekood: 101004

NUTRICIA
Nutrison
Energy
1,5 kcal/ml



Energiarikas toitelahus

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisevalmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,5 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvadest 35 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamiskiirustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

Kasutamiskiirused

Pakendi ühendamisest asepsilisel toitmiskiistemiiga (suletud süsteem) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1000 - 1500 ml päevas
1000 ml = 1500 kcal, mis katab
100 % mineraalainete ja vitamiinide vajaduse

Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

Toitumiskilane teave 100 ml tootes

Energia	630 kJ/150 kcal
Rasvad (35 E%)	5,8 g
millest: küllastunud rh	0,69 g
monoküllastumata rh	3,2 g
polüküllastumata rh	1,9 g
dokosaheksaenhape (DHA)	13,5 mg
eikosapentaenhape (EPA)	19,5 mg
Süsivesikud (49 E%)	18,3 g
millest: suhkrud	1,1 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	<0,1 g
Valgud (16 E%)	6,0 g
Sool	0,34 g
Vitamiinid	
A	123 µg RE
D3	2,55 µg
E	1,95 mg α-TE
K	12 µg
Tiamiin	0,3 mg
Riboflaviin	0,45 mg
Niatsiin	2,7 mg NE
Pantoteenhape	0,63 mg
B6	0,45 mg
Foolhape	36 µg
B12	0,6 µg
Biotiin	4,5 µg
C	19,5 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	135 mg
K	201 mg
Cl	100 mg
Ca	120 mg
P	90 mg
PO4	276 mg
Mg	31,2 mg
Fe	2,4 mg
Zn	1,5 mg
Cu	0,22 mg
Mn	0,23 mg
F	0,16 mg
Mo	16,5 µg
Se	8,6 µg
Cr	9 µg
I	21 µg
Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	55 mg
Osmolaarsus	400 mOsmol/l
Vesi (H2O)	78 ml

500 ml
Tootekood: 101021

1000 ml
Tootekood: 101006

Nutrison

Energy Multi Fibre

1,5 kcal/ml



Energiarikas toitelahus kiudainetega

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,53 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 48 %, rasvadest 34 %, kiudainetest 2 %
- P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 – 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamisläbiviisid

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral

Kasutamisharjumused

Pakendi ühendamisel aseptiliselt toitmissüsteemiga (suletud süsteem) on pudeli statiiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1000 – 1500 ml päevas
1000 ml = 1500 kcal, mis katab
100 % mineraalainete ja vitamiinide vajaduse

Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

Toitumisläbiviiside teave 100 ml tootes

Energia	643 kJ/153 kcal
Rasvad (34 E%)	5,8 g
millest: küllastunud rh	0,7 g
monoküllastumata rh	3,2 g
polüküllastumata rh	1,9 g
dokosaheksaeenhape (DHA)	13,9 mg
eikosapentaenehape (EPA)	20,1 mg
Süsivesikud (48 E%)	18,4 g
millest: suhkrud	2,6 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (16 E%)	6,0 g
Sool	0,34 g
Vitamiinid	
A	123 µg RE
D3	2,55 µg
E	1,95 mg α-TE
K	12 µg
Tiamiin	0,3 mg
Riboflaviin	0,3 mg
Niatsiin	2,7 mg NE
Pantoteenhape	0,63 mg
B6	0,45 mg
Foolhape	36 µg
B12	0,6 µg
Biotiin	4,5 µg
C	19,5 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	135 mg
K	201 mg
Cl	100 mg
Ca	120 mg
P	90 mg
Mg	31,2 mg
Fe	2,4 mg
Zn	1,5 mg
Cu	0,22 mg
Mn	0,23 mg
F	0,16 mg
Mo	16,5 µg
Se	8,6 µg
Cr	11 µg
I	21 µg
Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	55 mg
Osmolaarsus	480 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	76 ml

500 ml
Tootekood: 101001

1000 ml
Tootekood: 101005

Nutrison

1000 Complete Multi Fibre

1,0 kcal/ml



Vitamiinide- ja mineraalaineterikas toitelahus kiudainetega

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,04 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 21 %, süsivesikutest 43 %, rasvadest 32 %, kiudainetest 4 %
- P4 valgusegu** koosneb 4 komponendist: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Üks liiter toodet sisaldab vajaliku päevase koguse valke, vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 12 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamiskiirustused

Kasutatakse madala energianvajadusega või rasvunud patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Pea ja/või seljaaju traumad
- Kaasasündinud väärengused
- KNS häired
- Kooma
- Ajuinfarkt (insult)
- Parkinsoni tõbi
- Sclerosis multiplex
- Alzheimeri tõbi
- Dementsus

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral

Kasutamiskiirustused

Pakendi ühendamisest aseptiliselt toitmissüsteemiga (suletud süsteem) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine: 1000 ml päevas

NB! Ainulaadne toode, mille 1000 ml katab 100 % päevasest vitamiinide ja mineraalainete vajadusest

Pakend: 1000 ml plastpudel

Toitumiskalade teave 100 ml tootes

Energia	440 kJ/104 kcal
Rasvad (32 E%)	3,7 g
millest: küllastunud rh	1,0 g
monoküllastumata rh	2,0 g
polüküllastumata rh	0,7 g
dokosaheksaenehappe (DHA)	20,3 mg
eikosapentaenehappe (EPA)	30,0 mg
Süsivesikud (43 E%)	11,3 g
millest: suhkrud	0,8 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (4 E%)	2,0 g
Valgud (21 E%)	5,5 g
Sool	0,38 g
Vitamiinid	
A	123 µg RE
D3	2,0 µg
E	1,9 mg α-TE
K	8,0 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	2,7 mg NE
Pantoteenhappe	0,8 mg
B6	0,26 mg
Foolhape	40 µg
B12	0,32 µg
Biotiin	6,0 µg
C	15 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	150 mg
K	225 mg
Cl	145 mg
Ca	120 mg
P	96 mg
Mg	27 mg
Fe	2,4 mg
Zn	1,8 mg
Cu	270 µg
Mn	0,50 mg
F	0,15 mg
Mo	15 µg
Se	8,5 µg
Cr	10 µg
I	20 µg
Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	55 mg
Osmolaarsus	325 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	82 ml

NUTRICIA

Nutrison advanced Cubison

1,0 kcal/ml



Arginiini-, mikroelementide- ja antioksidantiderikas
toitelahus kiudainetega

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel toitelahus
- Energiasisaldus – 1,04 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 22 %, süsivesikutest 47 %, rasvadest 28 %, kiudainetest 3 %
- Valgurikas (kaseiin) – 5,5 g/100 ml, arginiini sisaldus (8,5 g/1000 ml) ja suurem kogus antioksidante (karotenoide, C- ja E-vitamiin, tsink), mis on vajalik haavade paranemiseks
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Süsivesikute allikas - maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 12 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamiskiirustused

Patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine ning kellel on lisatoitainete vajadus lamatiste või haavade tõttu

- Lamatise
- Põletused
- Operatsioonihavvad
- Traumade järgsed havvad

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi kriitilises seisundis haigetele

Kasutamiskiirused

Pakendi ühendamisest asepiiliselt toitmiskiistestega (suletud süsteem) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1000 - 2000 ml päevas

Pakend: 1000 ml plastpudel

Toitumiskiirane teave 100 ml tootes

Energia	435 kJ/104 kcal
Rasvad (28 E%)	3,3 g
millest: küllastunud rh	1,2 g
MCT	0,9 g
monoküllastumata rh	1,4 g
polüküllastumata rh	0,7 g
Süsivesikud (47 E%)	12,5 g
millest: suhkrud	1,0 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (3 E%)	1,5 g
Valgud (22 E%)	5,5 g
Sool	0,25 g

Vitamiinid	
A	82 µg RE
D3	0,70 µg
E	7,5 mg α-TE
K	5,3 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,19 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,53 mg
B6	0,20 mg
Foolhape	30 µg
B12	0,24 µg
Biotiin	4,0 µg
C	38 mg

Mineraalained ja mikroelementid	
Na	100 mg
K	150 mg
Cl	125 mg
Ca	80 mg
P	72 mg
Mg	23 mg
Fe	1,6 mg
Zn	2,0 mg
Cu	200 µg
Mn	0,38 mg
F	0,10 mg
Mo	10 µg
Se	9,6 µg
Cr	6,7 µg
I	13 µg

Muud	
L-karnitiin	0,85 g
Karotenoidid	0,23 mg
Koliin	37 mg
Osmolaarsus	315 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	83 ml

Tootekood: 101008

Nutrison advanced Diason Energy HP

1,5 kcal/ml




Energia- ja valgurikas toitelahus kiudainetega

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Kõrge energiasisaldus – 1,5 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 21 %, süsivesikutest 31 %, rasvadest 46 %, kiudainetest 2 %
- Valgurikas (7,7 g/100 ml), valguallikas – kaseinaat piimast ja osaliselt hüdrolyüsitud sojavalg
- Jälgida ja reguleerida vedelikutasakaalu
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses üle 12 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamiskiirustused

Patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine

- Diabeet ja hüperglükeemia
- Glükoositalumatus raskete traumade/vigastuste järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 12 aasta vanustele lastele
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitumiseks

Kasutamiskiirustused

Pakendi ühendamisest asepsisilist toitmiskõhustega (sulatud süsteem) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1000 - 2000 ml päevas
1000 ml = 1500 kcal, mis katab
100 % mineraalainete ja vitamiinide vajaduse

Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

Toitumiskalane teave 100 ml tootes

Energia	625 kJ/150 kcal
Rasvad (46 E%)	7,7 g
millist: küllastunud rh	0,8 g
monoküllastumata rh	4,6 g
polüküllastumata rh	2,3 g
dokosaheksaenehappe (DHA)	20 mg
eikosapentaenehappe (EPA)	29,9 mg
Süsivesikud (31 E%)	11,7 g
millist: suhkrud	4,5 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (21 E%)	7,7 g
Sool	0,33 g

Vitamiinid	
A	119 µg RE
D3	1,0 µg
E	3,6 mg α-TE
K	7,7 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	2,6 mg NE
Pantoteenhappe	0,77 mg
B6	0,24 mg
Foolhape	42 µg
B12	0,72 µg
Biotiin	5,8 µg
C	22 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	131 mg
K	200 mg
Cl	98 mg
Ca	82 mg
P	82 mg
Mg	37 mg
Fe	1,9 mg
Zn	1,4 mg
Cu	210 µg
Mn	0,38 mg
F	0,12 mg
Mo	12 µg
Se	8,7 µg
Cr	14 µg
I	16 µg

Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	53 mg
Osmolaarsus	395 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	77 ml

500 ml

Tootekood: 101023

1000 ml

Tootekood: 101018

NUTRICIA

Nutrison advanced Peptisorb

1,0 kcal/ml



Lõhustatud valguga ja madala rasvasisaldusega toitelahus

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiasisaldus 1 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 69 %, rasvadest 15 %
- Valguallikas – peptiidid
- Madala rasvasisaldusega
- 47 % rasvast kergesti imenduv MCT õli (keskmise ahelaga triglütseriidid)
- Süsivesikute allikas - maltodekstriin
- Kiudaineteta, laktoosita ja gluteenita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 – 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamiskiirustused

Kasutatakse raskete seedimis- ja imendumishäiretega patsientide toitumiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Äge pankreatiit
- Soole resektsioon
- Mittespetsiifilised soolepõletikud
- Ravile allumatu malabsorptsioon
- Lühikese soole sündroom
- Toitmine peensoole

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks toitumiseks

Kasutamiskiirustused

Pakendi ühendamisest asepsiliselt toitmiskitsustega (suletud kitsust) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud kitsust) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1500 – 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel

Toitumiskilane teave 100 ml tootes

Energia	423 kJ/100 kcal
Rasvad (15 E%)	1,7 g
millist: küllastunud rh	1 g
MCT	0,8 g
monoküllastumata rh	0,2 g
polüküllastumata rh	0,5 g
Süsivesikud (69 E%)	17,7 g
millist: suhkrud	1,7 g
laktoos	0,1 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (16 E%)	4,0 g
Sool	0,25 g
Vitamiinid	
A	82 µg RE
D3	0,70 µg
E	1,25 mg α-TE
K	5,3 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,16 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,53 mg
B6	0,17 mg
Foolhape	27 µg
B12	0,39 µg
Biotiin	4,0 µg
C	10 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	150 mg
Cl	133 mg
Ca	80,1 mg
P	70 mg
Mg	23 mg
Fe	1,58 mg
Zn	1,16 mg
Cu	180 µg
Mn	0,33 mg
F	0,10 mg
Mo	11 µg
Se	5,7 µg
Cr	6,7 µg
I	13 µg
Muud	
Karotenoidid	0,16 mg
Koliin	36,7 mg
Tauriin	10 mg
Osmolaarsus	455 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	84 ml

Tootekood: 101010

NUTRICIA

Nutrison Protein Plus

1,25 kcal/ml



Optimaalse energiasaldusega valgurikas toitelahus

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiselvalmis toitelahus
- Energia – 1,25 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 20 %, süsivesikutest 45 %, rasvadest 35 %
- Kõrgem valgusisaldus, 63 g/1000 ml, oluline kriitilises seisundis patsientidele
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Kiudaineteta, laktoosita ja gluteenita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamiskiirustused

Kasutatakse suurema energia ja valguvajadusega patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Operatsioonijärgses perioodis väljendunud hüperkataboolse seisundi korral
- Hulgitrauma
- Onkoloogilised haiged
- Rasked infektsioonid
- Põletused
- Hingamis- või südamepuudulikkus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

Kasutamiskiirused

Pakendi ühendamisest asepsiliselt toitmiskiistest (suletud süsteem) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 1000 ml plastpudel

Toitumiskiirane teave 100 ml tootes

Energia	525 kJ/125 kcal
Rasvad (35 E%)	4,9 g
millest: küllastunud rh	1,3 g
MCT	0,7 g
monoküllastumata rh	2,7 g
polüküllastumata rh	0,9 g
dokosaheksaenehappe (DHA)	20,4 mg
eikosapentaenehappe (EPA)	30,0 mg
Süsivesikud (45 E%)	14,2 g
millest: suhkrud	0,9 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	<0,1 g
Valgud (20 E%)	6,3 g
Sool	0,28 g
Vitamiinid	
A	102 µg RE
D3	1,7 µg
E	1,6 mg α-TE
K	6,6 µg
Tiamiin	0,19 mg
Riboflaviin	0,20 mg
Niatsiin	2,3 mg NE
Pantoteenhape	0,66 mg
B6	0,21 mg
Foolhape	33 µg
B12	0,26 µg
Biotiin	5,0 µg
C	13 mg
Mineeraalained ja mikroelemendid	
Na	111 mg
K	168 mg
Cl	80 mg
Ca	90 mg
P	90 mg
PO4	276 mg
Mg	28 mg
Fe	2,0 mg
Zn	1,5 mg
Cu	230 µg
Mn	0,41 mg
F	0,13 mg
Mo	13 µg
Se	7,1 µg
Cr	8,3 µg
I	17 µg
Muud	
Karotenoidid	0,25 mg
Koliin	46 mg
Osmolaarsus	275 mOsmol/l
Vesi (H2O)	81 ml

Tootekood: 101013

NUTRICIA

Nutrison

Protein Advance

1,28 kcal/ml



Optimaalse energiasaldusega valgurikas kiudainetega toitelahus

Toote iseloomustus

- Täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Suurem energiasaldus – 1,28 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 24 %, süsivesikutest 48 %, rasvadest 26 %, kiudainetest 2 %
- Valgurikas 7,5 g/100 ml (vajalik väljendunud metaboolse stressi korral)
- P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Süsivesikute allikas maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Sisaldab lahustuvate ja lahustumatute kiudainete segu – **MF6** (6 erinevat kiudainet)
- Gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamisläbiviisid

Kasutatakse metaboolse stressis patsientide toitmiseks enteraalset (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Kriitiliselt haiged patsiendid
- Operatsioonijärgne periood väljendunud hüperkatabolismiga
- Onkoloogilised haiged
- Hulgitraumad
- Rasked infektsioonid
- Põletused

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

Kasutamisharjumused

Pakendi ühendamisest asepsisilise toitmissüsteemiga (suletud süsteem) on pudeli statiiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel

Toitumissalade teave 100 ml tootes

Energia	540 kJ/128 kcal
Rasvad (26 E%)	3,7 g
mllest: küllastunud rh	1,0 g
MCT	0,5 g
monoküllastumata rh	2,0 g
polüküllastumata rh	0,7 g
dokosaheksaenehape (DHA)	20,4 mg
eikosapentaenehape (EPA)	30,0 mg
Süsivesikud (48 E%)	15,4 g
mllest: suhkrud	1,0 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (24 E%)	7,5 g
Sool	0,2 g
Vitamiinid	
A	95 µg RE
D3	1,7 µg
E	1,5 mg α-TE
K	6,1 µg
Tiamiin	0,19 mg
Riboflaviin	0,20 mg
Niatsiin	2,3 mg NE
Pantoteenhape	0,66 mg
B6	0,21 mg
Foolhape	33 µg
B12	0,30 µg
Biotiin	5,0 µg
C	13 mg
Mineeraalained ja mikroelemendid	
Na	81 mg
K	150 mg
Cl	80 mg
Ca	112 mg
P	91 mg
Mg	22 mg
Fe	2,0 mg
Zn	1,5 mg
Cu	230 µg
Mn	0,41 mg
F	0,13 mg
Mo	13 µg
Se	7,5 µg
Cr	8,3 µg
I	17 µg
Muud	
Karotenoidid	0,25 mg
Koliin	46 mg
Osmolaarsus	270 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	79 ml

NUTRICIA

Nutrison

Protein Intense

1,26 kcal/ml



Optimaalse energiasaldusega väga kõrge valgusaldusega toitelahus

Toote iseloomustus

- Täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Suurem energiasaldus – 1,26 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 32 %, süsivesikutest 33 %, rasvadest 35 %
- Valgurikas 10 g/100 ml (vajalik väljendunud metaboolse stressi korral)
- P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 – 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Kasutamisläbiviimised

Kasutatakse metaboolse stressis patsientide toitmiseks enteraalset (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Kriitiliselt haiged patsiendid
- Operatsioonijärgne periood väljendunud hüperkatabolismiga
- Onkoloogilised haiged
- Hulgitraumad
- Rasked infektsioonid
- Põletused

Vastunäbiviimised

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

Kasutamisel juhised

Pakendi ühendamisel aseptiliselt toitmissüsteemiga (suletud süsteem) on pudeli statiiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel

Toitumisläbiviimise teave 100 ml tootes

Energia	528 kJ/126 kcal
Rasvad (35 E%)	4,9 g
millest: küllastunud rh	1,3 g
Süsivesikud (33 E%)	10,4 g
millest: suhkrud	0,8 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	0,09 g
Valgud (32 E%)	10 g
Sool	0,29 g
Vitamiinid	
A	102 µg RE
D3	1,72 µg
E	1,63 mg α-TE
K	6,6 µg
Tiamiin	0,19 mg
Riboflaviin	0,29 mg
Niatsiin	2,31 mg NE
Pantoteenhape	0,66 mg
B6	0,21 mg
Foolhape	33,1 µg
B12	0,52 µg
Biotiin	5,0 µg
C	13,3 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	116 mg
K	218 mg
Cl	96,4 mg
Ca	75 mg
P	81,9 mg
Mg	22 mg
Fe	2,0 mg
Zn	1,45 mg
Cu	220 µg
Mn	0,35 mg
F	0,13 mg
Mo	13 µg
Se	6,83 µg
Cr	8,3 µg
I	18,9 µg
Muud	
Karotenoidid	0,20 mg
Koliin	46 mg
Osmolaarsus	275 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	81 ml

Tootekood: 101014

Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre

1,5 kcal/ml



Energia- ja valgurikas toitelahus kiudainetega

Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energiarikas – 1,53 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 20 %, süsivesikutest 44 %, rasvadest 34 %, kiudainetest 2 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja- (46 %) ja hernevalk (32 %). P4 valgusegu tagab mao kiire tühjenemise, mille tulemusena väheneb aspiratsioonioht.
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu MF6
- Gluteenita ja laktoosita

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelvalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Ei sobi alla 3 aastasta vanustele lastele. Üle 3aasta vanustel lastel kasutada ettevaatlikult ja meditsiinilise järelevalve all.
- Jälgida tarbitava vedeliku kogust, et säilitada organismi vedelikutasakaal



Kasutamised

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteralselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav ja kelle valgu- ja energianvajadus on suurem või on vajalik vedelikupiirang.

Vastunäidustused

- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima- või sojaavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

Kasutamishüüsed

Pakendi ühendamisest aseptiliselt toitmisseadmega (suletud süsteem) on pudeli statiiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisest (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1500-2000 ml päevas

Pakend: 500 ml plastpudel

Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	640 kJ/153 kcal
Rasvad (26 E%)	5,8 g
millest: küllastunud rh	1,5 g
MCT	0,9 g
monoküllastumata rh	3,2 g
polüküllastumata rh	1,0 g
dokosaheksaeenhape (DHA)	20,5 mg
eikosapentaenehape (EPA)	30,4 mg
Süsivesikud (44 E%)	16,9 g
millest: suhkrud	5,7 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (2 E%)	1,5 g
Valgud (20 E%)	7,5 g
Sool	0,22 g
Vitamiinid	
A	123 µg RE
D3	2,0 µg
E	1,9 mg α-TE
K	8,0 µg
Tiamiin	0,23 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	0,88 mg (2,7 mg NE)
Pantoteenhape	0,80 mg
B6	0,26 mg
Foolhape	40 µg
B12	0,54 µg
Biotiin	6,0 µg
C	15 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	88 mg
K	169 mg
Cl	57 mg
Ca	67 mg
P	62 mg
Mg	15 mg
Fe	2,5 mg
Zn	1,8 mg
Cu	0,28 mg
Mn	0,50 mg
F	0,12 mg
Mo	15 µg
Se	8,5 µg
Cr	10 µg
I	22 µg
Muud	
Karotenoidid	0,30 mg
Koliin	55 mg
Osmolaarsus	390 mOsmol/l
Vesi (H2O)	76 ml

Nutrison

PlantBased HP Multi Fibre

2,0 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energiarikas – 2,0 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 20 E%, süsivesikutest 37 E%, rasvadest 42 E%
- Sisaldab 6 komponendist koosnevat kiudaineteseogu MF6
- Gluteeni- ja laktoosivaba
- Sobib ka veganitele

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelvalve all.
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 18 aastat tarbida ettevaatlikult. Selles vanusegrupis kasutades tuleb välja arvestada sobiv päevane kogus ja patsienti hoolikalt jälgida.



Kasutamisläbikäik

Kasutatakse patsientide toitumiseks enteralselt (sondi kaudu) juhul, kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav ja patsiendil on suurem energia- ja valguvajadus ja/või vedeliku piirang ja kui toidu kogust on vaja piirata:

- Alatoitumus või selle tekkerisk
- Düsfaagia
- Ravile raskesti alluv kõhulahtisus
- Preoperatiivne ettevalmistus
- Raske krooniline haigus, millega kaasnevad funktsionaalsed häired
- Põletikuline soolehaigus
- Täieliku gastrektomia korral

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

Kasutamishüpped

Pakendi ühendamisest asepsisega toidussüsteemiga (suletud süsteem) on pudeli statiivil rippumise aeg maksimaalselt 24 tundi. Korgi eemaldamisel (avatud süsteem) on sees 8 tundi. Pärast avamist sulgeda korgiga ja säilitada külmikus kuni 24 tundi.

Doseerimine:

1000 - 1500 ml päevas vastavalt tervishoiutöötaja soovitusel

Pakend: 500 ml plastpudel

Toitumisläbikäik 100 ml tootes

Energia	840 kJ/200 kcal
Rasvad (42 E%)	9,3 g
millest: küllastunud rh	2,2 g
Süsivesikud (37 E%)	18,5 g
millest: suhkrud	1,3 g
laktoos	<0,01 g
Kiudained (1 E%)	1,5 g
Valgud (20 E%)	10 g
Sool	0,35 g
Vitamiinid	
A	100 µg RE
D3	2,66 µg
E	3,41 mg α-TE
K	10,0 µg
Tiamiin	0,18 mg
Riboflaviin	0,24 mg
Niatsiin	2,76 mg NE
Pantoteenhape	0,76 mg
B6	0,24 mg
Foolhape	37,8 µg
B12	0,57 µg
Biotiin	6,00 µg
C	14,7 mg
Mineeraalained ja mikroelemendid	
Na	140 mg
K	375 mg
Cl	240 mg
Ca	148 mg
P	114 mg
Mg	41,7 mg
Fe	2,13 mg
Zn	1,63 mg
Cu	210 µg
Mn	0,20 mg
F	0,25 mg
Mo	18,8 µg
Se	12,0 µg
Cr	8,37 µg
I	26,8 µg
Muud	
Koliin	73,4 mg
Osmolaarsus	510 mOsmol/l



Toote iseloomustus

- Pulbriline toit
- Energiasisaldus – 1 kcal/ml või 1,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvadest 35 %, kiudainetest 0 %
- Valguallikas – lehmapiima kaseiin
- Sisaldab antioksidantse toimega karotenoide
- Kiudaineteta
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisanäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks sondi kaudu, juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav.

- Alatoitumus või selle risk
- Düsfagia
- Isutus
- Dementsus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ja galaktoseemia haigetele
- Ei sobi lehmapiimavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud vesi valada steriilsesse nõusse ja lisada vajalik kogus Nutrison pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud.

5 mõõtlusikatit + 85 ml vett = 100 ml toitelahust

energiatihedusega 1 kcal/ml.

Valmis toitelahus kasutada ära 4 tunni jooksul. Manustada sondi kaudu.

Avatud pakend sulgeda ja hoida jahedas ja kuivas kohas (mitte külmikus ning sisu kasutada ära 1 kuu jooksul).

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitmisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatais pulbrit = 4,3 g pulbrit (20 kcal)

Toitumisalane teave 100 g tootes

Energia	1943 kJ/463 kcal
Rasvad (35 E%)	18,2 g
millest: küllastunud rh	8,5 g
Süsivesikud (49 E%)	56,6 g
millest: suhkrud	8,7 g
laktoos	<0,14 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (16 E%)	18,2 g
Sool	1,2 g
Vitamiinid	
A	381 µg RE
D3	6,01 µg
E	5,94 mg α-TE
K	24,4 µg
Tiamiin	0,69 mg
Riboflaviin	0,74 mg
Niatsiin	8,3 mg NE
Pantoteenhape	2,45 mg
B6	0,79 mg
Foolhape	123 µg
B12	1,02 µg
Biotiin	19,7 µg
C	59,5 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	472 mg
K	706 mg
Cl	578 mg
Ca	370 mg
P	290 mg
PO4	890 mg
Mg	69,3 mg
Fe	7,38 mg
Zn	5,54 mg
Cu	830 µg
Mn	0,93 mg
F	0,48 mg
Mo	48,6 µg
Se	26,4 µg
Cr	25,7 µg
I	63,1 µg
Muud	
Karotenoidid	0,74 mg
Koliin	165 mg
Osmolaarsus	320 mOsmol/l

Pakend: 430 g purk

Tootekood: 102027

NUTRIDRINK TOODETE UUS KUJUNDUS

Nutridringi pudelite kujundust täiustatakse klientide tagasiside põhjal. See toob erinevate toodete ja maitsete vahelised erinevused paremini esile.

Toodete toitaineline koostis ja maitSED ei muutu.

Muudatus toote nimetuses: Nutridrink ja Nutridrink Multi Fibre kaubamärgi nimele lisandub sõna Compact.

Üleminekuperioodil võivad tooted olla saadaval nii Nutridringina kui ka Nutridrink Compactina. Nutridrink Compact moka- ja vaniljemaitseline on uued maitSED tootevalikus.



Nutridrink



Nutridrink Compact maasikamaitseline
Nutridrink Compact vaniljemaitseline
Nutridrink Compact metsamarjamaitseline
Nutridrink Compact neutraalne

Nutridrink / Nutridrink Compact

2,4 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvade 35 %
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi <0,5 g
- Kiudaineteta
- Gluteenita

Kasutamisläbimõeldused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivsel
- Pea- ja kaelakirurgia järgselt
- Tsüstiline fibroos

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbimõeldus jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Ainsa toiduna päevas: 5 - 7 pudelit

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit

V.a. juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti.

Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva.

Toitumisläbimõeldus 100 ml tootes

Toitumisläbimõeldus Nutridrink® Compact vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	1010 kJ/240 kcal
Rasvad (35 E%)	9,3 g
millest: küllastunud rh	0,86 g
Süsivesikud (49 E%)	29,6 g
millest: suhkrud	15,5 g
laktoos	<0,5 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (16 E%)	9,6 g
Sool	0,24 g
Vitamiinid	
A	240 µg RE
D3	1,8 µg
E	3,0 mg α-TE
K	13 µg
Tiamiin	0,40 mg
Riboflaviin	0,40 mg
Niatsiin	4,3 mg NE
Pantoteenhape	1,3 mg
B6	0,40 mg
Foolhape	64 µg
B12	0,70 µg
Biotiin	9,6 µg
C	24 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	96 mg
K	237 mg
Cl	85 mg
Ca	176 mg
P	182 mg
Mg	32,5 mg
Fe	3,85 mg
Zn	2,9 mg
Cu	0,43 mg
Mn	0,84 mg
F	0,18 mg
Mo	24 µg
Se	14,7 µg
Cr	16 µg
I	36,3 µg
Muud	
Koliin	88,1 mg
Osmolaarsus	790 mOsmol/l
Vesi (H2O)	64 ml

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitset:

**Nutridrink Compact
metsamarjamaitse**
Tootekood: 102011

**Nutridrink
šokolaadimaitse**
Tootekood: 102019

**Nutridrink Compact
neutraalne**
Tootekood: 102009

**Nutridrink Compact
maasikamaitse**
Tootekood: 102008

**Nutridrink Compact
vaniljemaitse**
Tootekood: 102006



Nutridrink Protein / Nutridrink Compact Protein

2,4 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 24 %, süsivesikutest 41 %, rasvadest 35 %
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi – 0,3 g
- Kiudaineteta
- Gluteenita

Kasutamisläbikäidused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine, onkoloogilised haiged.

- Kiiritusravi korral
- Keemiaravi korral
- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Isutus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi kasutamiseks ainsa toiduna päevas, tagada piisav lisavedelik
- Vanuses 6 - 10 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäidus jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitmisläbikäiduspetsialist on soovitanud teisiti. Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva.

Toitumisläbikäidus teave 100 ml tootes

Toitumisläbikäidus teave Nutridrink® Compact Protein vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	1029 kJ/245 kcal
Rasvad (35 E%)	9,6 g
millest: küllastunud rh	0,86 g
Süsivesikud (44 E%)	25,1 g
millest: suhkru	13,7 g
laktoos	<0,35 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (24 E%)	14,6 g
Sool	0,09 g
Vitamiinid	
A	260 µg RE
D3	2,08 µg
E	4,9 mg α-TE
K	18,9 µg
Tiamiin	0,52 mg
Riboflaviin	0,56 mg
Niatsiin	4,12 mg NE
Pantoteenhape	1,53 mg
B6	0,61 mg
Foolhape	80,9 µg
B12	0,9 µg
Biotiin	10,1 µg
C	30,7 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	35 mg
K	97,6 mg
Cl	60 mg
Ca	350 mg
P	282 mg
Mg	54 mg
Fe	2,19 mg
Zn	2,58 mg
Cu	350 mg
Mn	0,64 mg
F	0,18 mg
Mo	21,5 µg
Se	15,4 µg
Cr	13 µg
I	49 µg
Muud	
Koliin	99,4 mg
Osmolaarsus	570 mOsmol/l
Vesi (H2O)	63 ml

Pakend: 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

Maitset:

Nutridrink Protein
mokaamaitse
Tootekood: 102007

Nutridrink Protein
maasikamaitse
Tootekood: 102013

Nutridrink Protein
vaniljemaitse
Tootekood: 102005

Nutridrink Protein
virsi-
mangomaitse
Tootekood: 102012

Nutridrink Protein
marjamaitse
Tootekood: 102010

Nutridrink Protein
jahutatav
punaste marjademaitse
Tootekood: 102020

Nutridrink Protein
neutraalne
Tootekood: 102021



Nutridrink

Compact Protein [®]Sensations



Toote iseloomustus

- Maitsemuutuste või sensoorse ülitundlikkusega patsientidele ette nähtud ravijook, mis stimuleerib örnalt maitsemeeli, kasutades jahutavaid või soojendavaid koostisosi, mis aktiveerivad kolmiknärvi sensoorse süsteemi ja parandavad söömiselamust
- Energiasisaldus – 2,4 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 24 %, süsivesikutest 41 %, rasvadest 35 %
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi – 0,3 g
- Kiudaineteta
- Gluteenita

Kasutamisinäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine, onkoloogilised haiged.

- Kiiritusravi korral
- Keemiaravi korral
- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energიაvajadus
- Isutus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi kasutamiseks ainsa toiduna päevas, tagada piisav lisavedelik
- Vanuses 6 - 10 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamismisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitmiseravispetsialist on soovitanud teisiti. Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva.

Toitumislane teave 100 ml tootes

Toitumislane teave Nutridrink® Compact Protein Sensations jahutavad punased marjad. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	1029 kJ/245 kcal
Rasvad (35 E%)	9,6 g
millest: küllastunud rh	0,86 g
Süsivesikud (41 E%)	25,1 g
millest: suhkru	13,7 g
laktoos	0,35 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (24 E%)	14,6 g
Sool	0,09 g

Vitamiinid	
A	260 µg RE
D3	2,08 µg
E	4,90 mg α-TE
K	18,9 µg
Tiamiin	0,52 mg
Riboflaviin	0,56 mg
Niatsiin	4,12 mg NE
Pantoteenhape	1,53 mg
B6	0,61 mg
Foolhape	80,9 µg
B12	0,90 mg
Biotiin	10,1 µg
C	30,7 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	35,0 mg
K	97,6 mg
Cl	60,0 mg
Ca	350 mg
P	282 mg
Mg	54,0 mg
Fe	2,19 mg
Zn	2,58 mg
Cu	350 mg
Mn	0,64 mg
F	0,18 mg
Mo	21,5 µg
Se	15,4 µg
Cr	13,0 µg
I	49,0 µg

Muud	
Koliin	99,4 mg
Osmolaarsus	570 mOsmol/l
Vesi (H2O)	63 ml

Pakend: 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

Maitseed:

jahutav punaste marjademaitseline
Tootekood: 172115

särtsakas troopilise ingverimaitseline

Nutridrink Protein Omega 3

2,4 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 24 E%, süsivesikutest 41 E%, rasvadest 35 E%
- Sisaldab EPA-t 880 mg/100 ml ja DHA-d 585 mg/100 ml
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi <0,35 g/100 ml
- Kiudaineteta
- Gluteenita

Kasutamisenäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine, onkoloogilised haiged.

- Kiiritus- ja keemiaravi ettevalmistusperioodid
- Kiiritus- ja keemiaravi ajal ja pärast seda
- Perioperatiivselt
- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Isutus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi kasutamiseks ainsa toiduna päevas, tagada piisav lisavedelik
- Vanuses 6 - 10 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamismisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

1 - 2 pudelit päevas vähemalt 14 päeva, välja arvatud juhul kui arst või toitmiseravispetsialist on soovitanud teisiti.

Toitumissalane teave 100 ml tootes

Toitumissalane teave Nutridrink® Protein Omega 3 jahutavate marjade näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	1029 kJ/245 kcal
Rasvad (35 E%)	9,6 g
mlleest: küllastunud rh	2,2 g
polüküllastumata rh	3,5 g
eikosapentaenehape (EPA)	880 mg
dokosaheksaenehape (DHA)	585 mg
Süsivesikud (41 E%)	25,1 g
mlleest: suhkrud	13,4 g
laktoos	<0,35 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (24 E%)	14,6 g
Sool	0,1 g

Vitamiinid	
A	232 µg RE
D3	7,85 µg
E	4,09 mg α-TE
K	14,0 µg
Tiamiin	0,24 mg
Riboflaviin	0,50 mg
Niatsiin	4,23 mg NE
Pantoteenhape	1,55 mg
B6	0,51 mg
Foolhape	35,4 µg
B12	1,04 µg
Biotiin	10,6 µg
C	31,4 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	39,1 mg
K	98,0 mg
Cl	46,8 mg
Ca	336 mg
P	287 mg
Mg	54,0 mg
Fe	2,37 mg
Zn	2,30 mg
Cu	340 µg
Mn	0,24 mg
F	0,25 mg
Mo	14,7 µg
Se	13,4 µg
Cr	8,48 µg
I	30,5 µg

Muud	
Koliin	99 mg
Osmolaarsus	570 mOsmol/l
Vesi (H2O)	63 ml

Pakend: 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

Maitseed:

Nutridrink Protein Omega 3 jahutav
marjamaitseline
Tootekood: 102022

Nutridrink Protein Omega 3 jahutav
mango-virsikumaitseline
Tootekood: 102023

Nutridrink PlantBased

1,5 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5 kcal/ml
- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energia osakaal valkudest 16 E%, süsivesikutest 49 E%, rasvadest 35 E%
- Valgualikas: herne- (68 %) ja sojavalg (32 %)
- Sobib ka veganitele, sisaldab vetikatest saadud D3 vitamiini
- Laktoosita, gluteenita, lehmapiimavalguta

Kasutamisenäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energიაvaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivselt
- Pea- ja kaelakirurgia järgselt
- Tsüstiline fibroos

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamismisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

1 - 3 pudelit lisaks muule toidule, 5 - 7 pudelit ainsa toiduna päevas, välja arvatud juhul kui arst või toitmisravispetsialist on soovitanud teisiti.

Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Nutridrink® PlantBased mango-passion näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	630 kJ/150 kcal
Rasvad (35 E%)	5,8 g
millest: küllastunud rh	0,61 g
Süsivesikud (49 E%)	18,6 g
millest: suhkrud	9,4 g
laktoos	0 g
Kiudained (0 E%)	0,05 g
Valgud (16 E%)	6 g
Sool	0,25 g
Vitamiinid	
A	93,8 µg RE
D3	2,69 µg
E	2,45 mg α-TE
K	8,75 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,20 mg
Niatsiin	2,13 mg NE
Pantoteenhape	0,95 mg
B6	0,21 mg
Foolhape	41,3 µg
B12	0,50 µg
Biotiin	6,40 µg
C	13,8 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	101 mg
K	222 mg
Cl	155 mg
Ca	125 mg
P	77,0 mg
Mg	17,5 mg
Fe	2,07 mg
Zn	1,43 mg
Cu	200 µg
Mn	0,15 mg
F	0,17 mg
Mo	15,8 µg
Se	8,75 µg
Cr	4,38 µg
I	18,7 µg
Muud	
Koliin	50 mg
Osmolaarsus	617 mOsmol/l
Vesi (H2O)	78 ml

Pakend: 200 ml plastpudel
(originaal = 4 × 200 ml)

Maitseed:

Nutridrink PlantBased
mango-passionimaitse
Tootekood: 102024

Nutridrink PlantBased
mokamaitse
Tootekood: 102025

Nutridrink

PlantBased Protein

2,0 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,0 kcal/ml
- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energia osakaal valkudest 20 E%, süsivesikutest 45 E%, rasvadest 35 E%
- Valguallikas: herne- ja sojavalg
- Sobib ka veganitele
- Laktoosi- ja gluteenivaba

Kasutamisanäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Pre- ja postoperatiivselt
- Tsüstiline fibroos

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järeelvalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toitainetallikana päevas
- Vanuses üle 3 aasta tarbida ettevaatlikult ja ainult arsti või toitumisravispetsilisti järeelvalvel



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamismisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Hernes-münt ja kõrvits-porgand-ingver maitseelised sobivad ka soojendatult. Mitte lasta keema, et säiliks kõik toitained. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

1 - 2 pudelit lisaks muule toidule, 4 - 5 pudelit ainsa toiduna päevas, välja arvatud juhul kui arst või toitumisravispetsilist on soovitanud teisiti.

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitseed:

Nutridrink PlantBased 2,0 kcal/ml cappucinomaitse
Tootekood: 102047

Nutridrink PlantBased 2,0 kcal/ml herne-mündimaitse
Tootekood: 102049

Toitumislane teave 100 ml tootes

Toitumislane teave Nutridrink® PlantBased Protein cappuccino näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	840 kJ/200 kcal
Rasvad (35 E%)	7,8 g
millest: küllastunud rh	0,81 g
Süsivesikud (45 E%)	22,5 g
millest: suhkrud	6,5 g
laktoos	<0,01 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (20 E%)	10 g
Sool	0,40 g

Vitamiinid	
A	141 µg RE
D3	5,00 µg
E	2,44 mg α-TE
K	13,1 µg
Tiamiin	0,20 mg
Riboflaviin	0,30 mg
Niatsiin	2,13 mg NE
Pantoteenhape	0,94 mg
B6	0,32 mg
Foolhape	55,0 µg
B12	0,84 µg
Biotiin	7,50 µg
C	26,7 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	158 mg
K	282 mg
Cl	162 mg
Ca	167 mg
P	133 mg
Mg	31,5 mg
Fe	3,00 mg
Zn	1,98 mg
Cu	300 µg
Mn	0,20 mg
F	0,25 mg
Mo	21,0 µg
Se	12,5 µg
Cr	6,58 µg
I	28,0 µg

Muud	
Koliin	75,0 mg
Osmolaarsus	790 mOsmol/l

Nutridrink PlantBased 2,0 kcal/ml ananassi-kookosemaitse
Tootekood: 102048

Nutridrink PlantBased 2,0 kcal/ml kõrvitsa-porgandi-ingverimaitse
Tootekood: 102050



Nutridrink Multi Fibre / Nutridrink Compact Fibre

2,4 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 42 %, rasvade 39 %, kiudainetest 3 %
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Valguallikas kaseiin
- Laktoosi – 0,51 g/100 ml
- Sisaldab mfc™ kiudainete segu
- Gluteenita

Kasutamisanäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toidainete- ja energiavaegus või on häiritud toidainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Kõhulahtisus/kõhukinnisus
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivselt
- Neuroloogilised haigused (insult)
- Tsüstiline fibroos

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi kiudainetevaba dieedi korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamiskvalmiskook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Ainsa toiduna päevas: 5 - 7 pudelit

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit

V.a.juhul, kui arst või toitmisravispetsialist on soovitanud teisiti.

Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	1007 kJ/240 kcal
Rasvad (39 E%)	10,4 g
mllest: küllastunud rh	0,93 g
Süsivesikud (42 E%)	25,4 g
mllest: suhkrud	13,4 g
laktoos	0,51 g
Kiudained (3 E%)	3,6 g
Valgud (16 E%)	9,5 g
Sool	0,21 g
Vitamiinid	
A	234 µg RE
D3	1,8 µg
E	3,17 mg α-TE
K	13 µg
Tiamiin	0,44 mg
Riboflaviin	0,46 mg
Niatsiin	4,40 mg NE
Pantoteenhape	1,4 mg
B6	0,46 mg
Foolhape	61,3 µg
B12	0,70 µg
Biotiin	9,6 µg
C	24 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	83 mg
K	208 mg
Cl	82 mg
Ca	165 mg
P	174 mg
Mg	32,4 mg
Fe	3,86 mg
Zn	2,8 mg
Cu	430 µg
Mn	0,80 mg
F	0,18 mg
Mo	24 µg
Se	14 µg
Cr	16 µg
I	37,4 µg
Muud	
Koliin	80,8 mg
Osmolaarsus	790 mOsmol/l
Vesi (H2O)	63 ml

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitsed:

Nutridrink Multi Fibre
maasikamaiteline
Tootekood: 102018

Nutridrink Compact Multi Fibre
mokamaiteline
Tootekood: 102053

Nutridrink Compact Multi Fibre
vaniljemaiteline
Tootekood: 102017



NUTRICIA

Nutridrink Jucy Plus

1,5 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 84 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 0 %
- Valguallikas on 12 g valku portsjoni kohta
- Süsivesikute allikad: maltodekstriin ja sahharoos
- Kiudaineteta
- Madala naatriumi- ja fosforisisaldusega
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisläbikäik

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavajadus või on häiritud toitainete omastamine ja vajavad piiratud rasvasisaldusega toitu.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Pankreatiit
- Pre- ja postoperatiivselt
- Põletikuline soolehaigus

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Üle 3 aasta vanustel lastel kasutada ettevaatlikult
- Ei sobi patsientidele, kellel on galaktoseemia

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelvalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäik jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toiduravispetsialist on soovitanud teisiti.

Toitumisläbikäik 100 ml tootes

Toitumisläbikäik Nutridrink® Jucy Plus jagatud vaarikamaitseline näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	637 kJ/150 kcal
Rasvad (0 E%)	0 g
millest: küllastunud rh	0 g
Süsivesikud (84 E%)	31,5 g
millest: suhkrud	13,6 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (16 E%)	6 g
Sool	0,02 g

Vitamiinid	
A	105 µg RE
D3	0,89 µg
E	1,83 α-TE
K	8,75 µg
Tiamiin	0,17 mg
Riboflaviin	0,22 mg
Niatsiin	0,46 mg (2,50 mg NE/EN)
Pantoteenhape	0,47 mg
B6	0,23 mg
Foolhape	16,1 µg
B12	0,38 µg
Biotiin	5 µg
C	13,8 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	5 mg
K	8,4 mg
Cl	218 mg
Ca	15,1 mg
P	14,7 mg
Mg	1,64 mg
Fe	2,15 mg
Zn	1,61 mg
Cu	0,21 mg
Mn	0,15 mg
F	0,17 mg
Mo	9,34 µg
Se	8,75 µg
Cr	4,38 µg
I	19,1 µg

Muud	
Koliin	50 mg
Osmolaarsus	930 mOsmol/l

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitset:

õuna

jahutav
vaarikamaitseline
Tootekood: 185081

mango-
ananassimaitseline
Tootekood: 185082

mustsõstra

pirni-leedrimarmaitseline
Tootekood: 185163





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,04 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 19 %, süsivesikutest 45 %, rasvadest 33 %, kiudainetest 3 %
- Laktoosi – 2,5 g/100 ml
- Sisaldab polüküllastumata rasvhappeid, mis on oluline südameveresoonkonna tervisele
- Sisaldab antioksidante (C- ja E-vitamiinid, karotenoidid, seleen)
- Sisaldab kiudaineid glükeemilise indeksi vähendamiseks
- Gluteenita ja sahharoosita

Kasutamisläbikäidustused

Diabeedihäigetele ja hüperglükeemiaga patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toita- ja energiasisaldus või on häiritud toita- ja energiasisaldus.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiasisaldus
- Toita- ja energiasisalduse häired
- Pre- ja postoperatiivset
- Neuroloogilised haigused (insult)
- Tsüstiline fibroos

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele, fruktoosemia ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas. Järgida, et lisaks tarbitakse piisavalt vedelikku
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäidus jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Ainsa toiduna päevas:

7 - 10 pudelit

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit

V.a.juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti.

Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva.

Toitumisläbikäidus 100 ml tootes

Toitumisläbikäidus Diasip® vanilje näitel.

Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	435 kJ/104 kcal
Rasvad (33 E%)	3,8 g
millest: küllastunud rh	0,44 g
Süsivesikud (45 E%)	11,5 g
millest: suhkru	8,4 g
laktoos	3,54 g
Kiudained (3 E%)	2,5 g
Valgud (19 E%)	4,9 g
Sool	0,13 g

Vitamiinid	
A	79,1 µg RE
D3	1,29 µg
E	2,5 mg α-TE
K	5,52 µg
Tiamiin	0,40 mg
Riboflaviin	0,26 mg
Niatsiin	1,9 mg NE
Pantoteenhape	0,91 mg
B6	0,34 mg
Foolhape	38 µg
B12	0,55 µg
Biotiin	6,38 µg
C	15 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	50,1 mg
K	99,6 mg
Cl	42,8 mg
Ca	53,5 mg
P	49,6 mg
Mg	22,2 mg
Fe	1,65 mg
Zn	1,27 mg
Cu	200 µg
Mn	0,33 mg
F	0,10 mg
Mo	10 µg
Se	7,5 µg
Cr	12 µg
I	15,7 µg

Muud	
Karotenoidid	0,16 mg
Koliin	49,8 mg
Osmolaarsus	365 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	83 ml

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitseed:

Diasip vaniljemaitseline
Tootekood: 102014

Diasip maasikamaitseline
Tootekood: 102015



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,28 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 28 %, süsivesikutest 46 %, rasvadest 26 %, kiudainetest 0 %
- Laktoosi – 1,7 g/100 ml
- Kõrge valgu- ja arginiini sisaldusega haavade paranemise soodustamiseks
- Suurem antioksidantide sisaldus (karotenoidid, C- ja E-vitamiinid, tsink) haavade paranemise soodustamiseks
- Madala rasvasisaldusega
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisanõidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ning lisatoitainete vajadus lamatiste või haavade tõttu.

- Lamatised
- Suured pea- ja kaela- ning kõhupiirkonna operatsioonid
- Põletused
- Alatoitumus või selle risk

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi kriitiliselt haigetele patsientidele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 17 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule: 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitmiseravispetsialist on soovitanud teisiti.

Toitumissalane teave 100 ml tootes

Toitumissalane teave Cubitan® vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	520 kJ/124 kcal
Rasvad (26 E%)	3,5 g
millest: küllastunud rh	0,5 g
Süsivesikud (46 E%)	14,5 g
millest: suhkrud	7,1 g
laktoos	1,7 g
Kiudained (0 E%)	<0,5 g
Valgud (28 E%)	8,8 g
millest: L-karnitiin	1,51 g
Sool	0,13 g

Vitamiinid	
A	119 µg RE
D3	1,3 µg
E	19 mg α-TE
K	10 µg
Tiamiin	0,28 mg
Riboflaviin	0,63 mg
Niatsiin	3,4 mg NE
Pantoteenhape	1,0 mg
B6	0,65 mg
Foolhape	100 µg
Bi2	0,79 µg
Biotiin	7,5 µg
C	125 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	50 mg
K	150 mg
Cl	80 mg
Ca	225 mg
P	182 mg
PO4	558 mg
Mg	42 mg
Fe	3,0 mg
Zn	4,5 mg
Cu	680 µg
Mn	1,3 mg
F	0,19 mg
Mo	19 µg
Se	32 µg
Cr	13 µg
I	25 µg

Muud	
Karotenoidid	0,75 mg
Koliin	69 mg
Osmolaarsus	500 mOsmol/l
Vesi (H2O)	80 ml

Pakend: 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

Maitseed:

Cubitan
maasikamaiteline
Tootekood: 102038

Cubitan
šokolaadimaiteline
Tootekood: 102037

Cubitan
vaniljemaiteline
Tootekood: 102039



Renilon 4.0

2,0 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 8 %, süsivesikutest 47 %, rasvadest 45 %, kiudainetest 0 %
- Laktoosi – <0,05 g/100 ml
- Madal valgusisaldus
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Madal Na, K, Cl, Ca, P, Mg sisaldus
- Suurem antioksidantide sisaldus: karotenoidid, E-vitamiin, tsink, seleen
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisinäidustused

Valgu-, mineraalainete- ja vedelikupiirangut vajavatele patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toidainete- ja energiavaegus või on häiritud toidainete omastamine ja vajavad täiendavat toetust.

- Neerupuudulikkus
- Neeruasendusravi

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamiskvalmiskook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule:

Täiskasvanutele 1 - 3 pudelit päevas.

Lastele – ainult meditsiinitöötaja soovitusel.

V.a.juhul, kui arst või toitmiseravispetsialist on soovitanud teisiti.

Toitumisalane teave 100 ml tootes

Energia	838 kJ/200 kcal
Rasvad (45 E%)	10,0 g
millest: küllastunud rh	0,84 g
Süsivesikud (47 E%)	23,6 g
millest: suhkrud	5,0 g
laktoos	<0,05 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (8 E%)	4,0 g
Sool	0,09 g
Vitamiinid	
A	0 µg RE
D3	1,45 µg
E	5,0 mg α-TE
K	11 µg
Tiamiin	0,30 mg
Riboflaviin	0,38 mg
Niatsiin	3,62 mg NE
Pantoteenhape	1,06 mg
B6	0,6 mg
Foolhape	100 µg
B12	0,47 µg
Biotiin	8,0 µg
C	6,0 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	37,8 mg
K	27,9 mg
Cl	<7,0 mg
Ca	<7,5 mg
P	<6,0 mg
Mg	<1,5 mg
Fe	3,2 mg
Zn	2,71 mg
Cu	400 µg
Mn	0,75 mg
F	0,20 mg
Mo	17 µg
Se	16 µg
Cr	13 µg
I	26,9 µg
Muud	
L-karnitiin	14,8 mg
Karotenoidid	0,45 mg
Tauriin	15 mg
Koliin	73,4 mg
Osmolaarsus	455 mOsmol/l
Vesi (H2O)	71 ml

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitsed:

Renilon 4.0
aprikoosimaiteline
Tootekood: 102031

Renilon 7.5

2,0 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 15 %, süsivesikutest 40 %, rasvade 45 %, kiudainetest 0 %
- Laktoosi – 0,1 g/100 ml
- Valgusisalduselt sobib dialüüsi patsientidele
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Madal Na, K, Cl, Ca, P, Mg sisaldus
- Suurem antioksidantide sisaldus: karotenoidid, E-vitamiin, tsink, seleen
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisläbikäidustused

Valgu-, mineraalainete- ja vedelikupiirangut vajavatele patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toidainete- ja energiaaegus või on häiritud toidainete omastamine ja vajavad täiendavat toetust.

- Neerupuudulikkus
- Dialüüsi patsient
- Diabeetiline nefropaatia

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamiskõlblik jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule:

Täiskasvanutele 1 - 3 pudelit päevas.

Lastele – ainult meditsiinitöötaja soovitusel.

V.a.juhul, kui arst või toitmiseravispetsialist on soovitanud teisiti.

Toitumislane teave 100 ml tootes

Energia	835 kJ/200 kcal
Rasvad (45 E%)	10,0 g
mllest: küllastunud rh	0,94 g
Süsivesikud (40 E%)	20,0 g
mllest: suhkrud	4,9 g
laktoos	<0,10 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (15 E%)	7,5 g
Sool	0,15 g

Vitamiinid	
A	0 µg RE
D3	0 µg
E	5,05 mg α-TE
K	11,2 µg
Tiamiin	0,29 mg
Riboflaviin	0,40 mg
Niatsiin	3,69 mg NE
Pantoteenhape	1,14 mg
B6	0,95 mg
Foolhape	99,2 µg
B12	0,53 µg
Biotiin	8,0 µg
C	6,0 mg

Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	61 mg
K	34 mg
Cl	<15,0 mg
Ca	<11,0 mg
P	<9,0 mg
PO4	<27,6 mg
Mg	<2,0 mg
Fe	2,0 mg
Zn	2,0 mg
Cu	420 µg
Mn	0,78 mg
F	0,20 mg
Mo	15 µg
Se	17 µg
Cr	9 µg
I	27,1 µg

Muud	
L-karnitiin	14,9 mg
Karotenoidid	0,47 mg
Tauriin	15,8 mg
Koliin	40 mg
Osmolaarsus	410 mOsmol/l
Vesi (H2O)	71 ml

Pakend: 125 ml plastpudel
(originaal = 4 × 125 ml)

Maitse:

Renilon 7.5
karamellimaiteline
Tootekood: 102032



NUTRICIA
Souvenaid
1,0 kcal/ml



Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 10 E%, süsivesikutest 50 E%, kiudainetest 1 E%, rasvadest 39 E%
- Sisaldab Fortasyn® Connect segu
- Gluteeni- ja laktoosivaba

Kasutamisläbikäik

Dieetraviks varase staadiumi Alzheimeri tõve korral.

Vastunäidustused

- Ei sobi galaktoseemihaigetele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelvalve all
- Toode ei sobi ainsa toitainelikkana päevaseks
- Kasutatakse lisaks tavatoidule



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäik jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

1 pudel (125 ml) päevas lisaks muule toidule.

Toitumisläbikäik 100 ml tootes

Toitumisläbikäik Souvenaid® cappuccino näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

Energia	423 kJ/101 kcal
Rasvad (39 E%)	4,3 g
millest: küllastunud rh	1,5 g
eikosapentaenhape (EPA)	240 mg
dokosaheksaenhape (DHA)	960 mg
Süsivesikud (50 E%)	12,4 g
millest: suhkrud	6,4 g
laktoos	<0,025 g
Kiudained (1 E%)	0,55 g
Valgud (10 E%)	2,6 g
Sool	0,25 g
Vitamiinid	
A	160 µg RE
D3	0,80 µg
E	32 mg α-TE
K	6,17 µg
Tiamiin	0,15 mg
Riboflaviin	0,17 mg
Niatsiin	1,8 mg NE
Pantoteenhape	0,53 mg
B6	0,80 mg
Foolhape	320 µg
B12	2,4 µg
Biotiin	4,00 µg
C	64 mg
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	100 mg
Cl	116 mg
Ca	80 mg
P	70 mg
Mg	20 mg
Fe	1,6 mg
Zn	1,2 mg
Cu	180 µg
Mn	0,33 mg
Mo	10 µg
Se	48 µg
Cr	6,8 µg
I	16 µg
Muud	
Uridiin 5'-monofosfaat	500 mg
Koliin	320 mg
Osmolaarsus	510 mOsmol/l

Pakend: 125 ml plastpudel

Maitset:

Souvenaid
maasikamaitse
Tootekood: 102045

Souvenaid
maasikamaitse
Tootekood: 102044

Souvenaid
vaniljemaitse
Tootekood: 102046





Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 100 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 0 %
- Sisaldab süsivesikuid ja elektrolüüte
- Laktoosita
- Kiudaineteta ja gluteenita

Kasutamisläbikäik

Operatsioonieelselt organismi energia- ja vedelikuvajaduse katmiseks ning operatsioonijärgse insuliiniresistentsuse vähendamiseks.

- Plaanilised operatsioonid

Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ja väikelastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Lastel ja diabeetikutel kasutada ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

Doseerimine

Operatsioonieelsel ööl:
4 × 200 ml
Operatsioonipäeval kuni 2 tundi enne (pre)anesteesiat: 2 × 200 ml

Toitumisläbikäik 100 ml tootes

Energia	215 kJ/50 kcal
Rasvad (0 E%)	0 g
millest: küllastunud rh	0 g
Süsivesikud (100 E%)	12,6 g
millest: suhkrud	2,1 g
laktoos	<0,006 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (0 E%)	0 g
Sool	0,13 g
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	50 mg
K	122 mg
Cl	6 mg
Ca	6 mg
P	1 mg
Mg	1 mg
Muud	
Osmolaarsus	240 mOsmol/l
Vesi (H ₂ O)	92 ml

Pakend: 200 ml plastpudel
(originaal = 4 × 200 ml)

Maitse:

PreOp
sidrunimaiteline
Tootekood: 102033



Toote iseloomustus

- Rasvaemulsioon
- Energiaisaldus – 4,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 0 %, rasvadest 100 %, kiudainetest 0 %
- Taimsete õlide segu, polüküllastumata rasvhapete rikas
- Sisaldab väikestes kogustes Na ja Cl
- Ei sisalda mikroelemente ega vitamiine
- Gluteenita ja laktoosita

Kasutamisläidustused

Kõrge energiavajadusega patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Onkoloogilised haigused
- Neeruhaigused
- Tsüstiline fibroos
- Isutus
- HIV

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toode tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses alla 6 aastat tarbida ettevaatlikult



Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamislvalmis. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Lastele alla 5 aastat on soovitatav lahjendada. Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 14 päeva jooksul.

Doseerimine

Lisaks muule toidule 3 x 30 ml/päevas.

Toitumislalane teave 100 ml tootes

Energia	1850 kJ/450 kcal
Rasvad (100 E%)	50,0 g
millest: küllastunud rh	5,3 g
Süsivesikud (0 E%)	0,1 g
millest: suhkrud	0 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (0 E%)	0 g
Sool	0,02 g
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	7 mg
Cl	0,1 mg
Muud	
Osmolaarsus	0 mOsmol/l

Pakend: 200 ml plastpudel
(originaal = 4 x 200 ml)

Maitse:

Calogen
neutraalse maitsega
Tootekood: 102036



Toote iseloomustus

- Pulber
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,68 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 95 %, süsivesikutest 1 %, rasvadest 4 %, kiudainetest 0 %
- Valguallikas – lehmapiimavalgu
- Madala rasvasisaldusega
- Gluteenita

Kasutamisläidustused

Kasutatakse lisandina toidule, kui tavalisest toidust ja joogist ei piisa valguvajaduse katmiseks.

- Põletused
- Haavad, lamatised
- Valgukaotus eritiste ja vedelikega

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aastastele lastele ja galaktoseemia haigetele
- Ei sobi lehmapiimavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud ja jahutatud vesi valada puhtasse nõusse ja lisada vajalik kogus Protifari pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud ja moodustub homogeenne pasta, mida saab lisada toitule ja jookidele. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Protifariga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul. Avatud pakend sulgeda ja hoida jahedas ja kuivas kohas (mitte külmikus ning sisu kasutada ära 1 kuu jooksul).

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitmisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 2,5 g pulbrit (2,2 g valku)

Toitumislalane teave 100 g tootes

Energia	1560 kJ/368 kcal
Rasvad (4 E%)	1,6 g
millest: küllastunud rh	1,2 g
Süsivesikud (1 E%)	<1,5 g
millest: suhkrud	<1,5 g
Kiudained (0 E%)	0 g
Valgud (95 E%)	87,2 g
Sool	0,25 g
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	100 mg
K	140 mg
Cl	80 mg
Ca	1350 mg
P	700 mg
Mg	≤20 mg
Muud	
Osmolaarsus	25 mOsmol/l



Pakend: 225 g purk

Tootekood: 102028



Toote iseloomustus

- Pulber
- Neutraalse maitsega, saab lisada nii soolastele kui magusatele toitudele/jookidele
- Energiaväärtus – 2,2 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 4 %, süsivesikutest 27 %, rasvadest 1 %, kiudainetest 68 %
- 1 mõõtelusikatäis sisaldab 4,8 g kiudaineid
- Gluteenita

Kasutamisinäidustused

Kasutatakse lisandina toidule, kui patsient ei saa tavatoidust piisavalt kiudaineid.

Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aastastele lastele
- Üle 3 aasta vanustel lastel kasutada ettevaatlikult

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelvalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Ainult enteraalseks kasutamiseks

Säilitamine ja kasutamine

Hoida korralikult suletuna kuivas ja jahedas kohas (mitte külmikus). 1 tasandatud mõõtelusikas (6,3 g pulbrit) sisaldab 4,8 g kiudaineid. Käed pesta, kasutada puhtaid nõusid, veenduda, et pakend on pealt puhas.

Segada 1 mõõtelusikas 20 ml kuuma veega ja siis lisada see toiduportsjonile või lisada 1 mõõtelusikatäis ühele toiduportsjonile. Kasutada ainult pakendis olevat mõõtelusikat.

Valmistada toit ühe portsjoni kaupa ja kasutada see ära 2 tunni jooksul.

Järelejäänud toiduports tuleb ära visata.

Avatud pakend sulgeda ja hoida jahedas ja kuivas kohas (mitte külmikus ning sisu kasutada ära 6 nädala jooksul.

Doseerimine

Sõltuvalt kiudainete saamisest tavatoidust, tarbida lisaks 2 - 4 mõõtelusikat (umbes 10 - 20 g kiudaineid) päevas.

3 - 12 aasta vanustele lastele soovitatakse väiksemat doosi (5 - 10 g päevas).

Toitumisalane teave 100 g tootes

Energia	931 kJ/223 kcal
Rasvad (1 E%)	0,3 g
millest: küllastunud rh	0,06 g
Süsivesikud (27 E%)	15 g
millest: suhkrud	2,5 g
Kiudained (68 E%)	75,6 g
Valgud (4 E%)	2,2 g
Sool	0,13 g
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	50,1 mg
K	287 mg
Ca	257 mg
P	150 mg



Pakend: 400 g purk

Tootekood: 54013

Toote iseloomustus

- Pulber vedeliku ja toidu paksendamiseks, ei muutu amülaasi toimel vedelaks
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,6 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 97 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 3 %
- Sisaldab maltodekstriini (modifitseeritud maisitärklisest)
- Gluteenita, laktoosita

Kasutamisenäidustused

- Neelamishäiretega patsientidele, kelle toitu või vedelikku on vaja paksendada

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



Säilitamine ja kasutamine

Lisage arsti või toitumisspetsialisti poolt soovitatud koguses Nutlis pulbrit toidule. Raputage, loksutage või segage kuni pulber on täielikult lahustunud. Laske segul mõni minut pakseneda. Ärge lisage sel ajal pulbrit juurde, sest segu paksenemine alles jätkub. Paksendatud toitu saab kuumutada, jahutada või külmutada. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Nutlis pulbriga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 4 g pulbrit

Toitumisalane teave 100 g tootes

Energia	1545 kJ/363 kcal
Rasvad (0 E%)	0,1 g
millest: küllastunud rh	0,1 g
Süsivesikud (97 E%)	87,5 g
millest: suhkrud	1,5 g
Kiudained (3 E%)	5,8 g
Valgud (0 E%)	0,26 g
Sool	<0,20 g
Mineraalained ja mikroelemendid*	
Na	<91 mg
K	<75 mg
Cl	<35 mg
Ca	<21 mg
P	<17 mg
Mg	<3,5 mg

*Mineraalid esinevad toorainetes nende looduslikul tasemel

Pakend: 300 g purk

EAN: 4008976681236
SAP: 54274



Toote iseloomustus

- Pulber vedeliku ja toidu paksendamiseks, ei muutu amülaasi toimel vedelaks
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,63 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 96 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 4 %
- Sisaldab maltodekstriini (modifitseeritud maisitärklisest)
- Gluteenita, laktoosita

Kasutamisläbikäik

- Neelamishäiretega patsientidele, kelle toitu või vedelikku on vaja paksendada

Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



Säilitamine ja kasutamine

Lisage arsti või toitumisspetsialisti poolt soovitatud koguses Nutris Clear pulbrit toidule. Raputage, loksutage või segage kuni pulber on täielikult lahustunud. Laske segul mõni minut pakseneda. Ärge lisage sel ajal pulbrit juurde, sest segu paksenemine alles jätkub. Paksendatud toitu saab kuumutada, jahutada või külmutada. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Nutris Cleariga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 1,5 g pulbrit

Maht

1. tase - õrnalt paks
2. tase - kergelt paks
3. tase - mõõdukalt paks
4. tase - vähe paks

200 ml

- 1 mõõtlusikatäis
- 2 mõõtlusikatäit
- 3 mõõtlusikatäit
- 7 mõõtlusikatäit

Pakend: 175 g purk

Toitumisläbikäik 100 g tootes

Energia	1217 kJ/290 kcal
Rasvad (0 E%)	0 g
millest: küllastunud rh	0 g
Süsivesikud (80 E%)	57,6 g
millest: suhkrud	3,7 g
Kiudained (19 E%)	28 g
Valgud (1 E%)	0,8 g
Sool	3,8 g
Mineraalained ja mikroelemendid	
Na	1500 mg
K	<40 mg
Cl	<30 mg
Ca	<20 mg
P	<50 mg
Mg	<20 mg

Flocare® Infinity™ III enteraalse toitmise pump



Pumba iseloomustus ja peamised tehnilised andmed:

- Pump töötab igas asendis
- Manustamiskiirus 1 - 600 ml/h sammuga 1 ml
- Süsteemi täitmiskiirus 700 ml/tunnis
- Doosi suurus 1 - 3500 ml sammuga 1 ml
- Pump töötab vooluvõrgus või liitium-ioon akul
- Aku: sisemine laetav liitium-ioon aku, 3,6 V DC 2000 mAh
- Aku mahtuvus (kui aku ei ole üle 2 aasta vana):
24 tundi kiirusel 125 ml/h, 12h tundi 250 ml/h
- Toide: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz; 0,4 A max
- Elektrikatkestuse korral lülitub pump automaatselt akutoitele
- Hästi loetav valgustatud LCD ekraan: 2,8" täisvärv, 640 x 480 px;
175 kraadi nähtavusnurk
- Probleemi korral - nii visuaalne kui ka akustiline alarm
- IPX 5: veepritsmekindel: ükskõik millisest suunast tulevad veejoad ei mõjuta pump
- Veekindel - võib loputada voolava vee all
- Klamber pumba kinnitamiseks statiivi külge
- Võimalus ühendada patsiendi seiresüsteemiga (PDMS)
- Manustamistäpsus $\pm 5,0$ % juhul, kui pumpa kasutatakse koos Flocare® Infinity™ enteraalse toitmissüsteemiga
- Oklusiooni avastamisrõhk:
- Ülesvoolu oklusioonirõhk: -34 kPa (± 21 kPa)
- Allavoolu oklusioon: 83 kPa (± 21 kPa)
- Õhumullide avastamine $>0,5$ - 1 ml õhku toitmissüsteemis
- Võimalikud teraapiad (3): maht/kiirus, voolukiirus, vahelduv
- Vahelduva toitmise booluste arv 2 - 12 ja intervalliga 5 minutit
24 tundi 5 minutilise sammuga

Mõõdud

u. 154 mm x 120 mm x 49 mm

Kaal 432 g

Toote ref.kood:

621825

flocare®
Infinity™ III



Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbale; 40 mm korgile - ENFit

Enteraalne toitmissüsteem Infinity pumbaga toitmiseks on ette nähtud sonditoidu manustamiseks plastpudelitest (125 ml, 200 ml, 500 ml ja 1000 ml).

Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil.

Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. Otsik ühendamiseks pudeliga
- B. Tilgakamber
- C. Ühendus Flocare Infinity pumbaga
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. Enfit otsik sondiga ühendamiseks
- F. Kork süsteemi sulgemiseks
- G. Riputusaas

Pakend


Iga süsteem on eraldi pakendis.

Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.

Toote ref.kood:

590084



Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbale; spike ENFit

Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks spikeühendusega pehmetest plastpudelitest toitmispumbaga. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. Spike otsik ühendamiseks pehme plastpudeliga
- B. Tilgakamber
- C. Ühendus Flocare Infinity pumbaga
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. ENFit otsik sondiga ühendamiseks
- F. Kork süsteemi sulgemiseks
- G. Kork spike otsikule

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Kabis 30 tk.

Toote ref.kood:

586514



Flocare® Infinity™ toitmissüsteem 1,3 L mahutiga pumbale, ENFit

Enteraalne toitmissüsteem Infinity pumbaga toitmiseks on ette nähtud sonditoidu manustamiseks 1,3 liitrisest reservuaarist.

Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad

- A. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- B. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- C. Ühendus Flocare® Infinity™ pumbaga
- D. Kork

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.

Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.

Toote ref.kood:

90011



Flocare® Infinity™ universaalne toitmispumba raam

Sobib kasutamiseks:

- Flocare® Infinity™ II või III pumpaga
- Koos erinevate Nutricia sonditoidu pakenditega/
Optri pudeli- või Flocare® konteinerite versioonidega
- Kas pumbaga toitmiseks või gravitatsiooni meetodil toitmiseks
(tilgakambriga või ilma)
- Saab asetada lauale seisma või kasutada Flocare® seljakotis

Pakend

1 karbis (TU), mittesteriilne.

Toote ref.kood:

188229



Flocare® toitmissüsteem gravitatsioonimeetodil toitmiseks 40mm korgile ENFit

Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks plastpudelitest (125 ml, 200 ml, 500 ml ja 1000 ml) sondi kaudu gravitatsioonimeetodil. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad


- A. Otsik pudeliga ühendamiseks
- B. Õhufilter
- C. Tilgakamber
- D. Tilkumise kiiruse regulaator
- E. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- F. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- G. Kork süsteemi sulgemiseks
- H. Riputusaas

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Kabis 30 tk.

Toote ref.kood:

90070



Flocare® toitmissüsteem gravitatsioonimeetodil toitmiseks; spike ENFit

Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks spikeühendusega pehmetest plastpudelitest gravitatsioonimeetodil. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

Toitmissüsteemi osad


- A. Spike otsik ühendamiseks sonditoidu pakendiga
- B. Tilgakamber
- C. Tilkumise kiiruse regulaator
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- F. Kork spike otsikule
- G. Kork süsteemi sulgemiseks

Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Karbis 30 tk.

Toote ref.kood:

86460



Flocare® toitmissüsteem 1,3 L reservuaariga gravitatsioonimeetodil toitmiseks

Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoitu manustamiseks gravitatsiooni meetodil 1,3 liitrisest reservuaarist.

Toitmissüsteem on mõeldud kasutamiseks ühele patsiendil.

Vahetada iga 24 tunni järel.

ENFit-ühilduv.

Koosneb 1,3-liitrisest reservuaarist (valmistatud etüleen-vinüülataadist, EVA).

Flocare® Gravity toitmissüsteemide vooliku siseläbimõõt on 3,9 mm.

Toitmissüsteemi osad


- B. Tilgakamber 1,3L (EVA)
- C. Tilkumise kiiruse regulaator (PS, PE)
- D. ENFit Male Y-port (PVC, PE)
- E. ENFit Male Y-port (PVC, PE)
- F. Voolik 5,3 mm diameetriga (PVC)
- N. Ülevaht täidetav reservuaar 1,3L (EVA)

Pakend

1 blisterpakendis (CU),
10 karbis (TU),
steriliseerimine – ETO

Toote ref.kood:

89827



Flocare® ENFit kahe spikega vaheühendus

Kasutamine

Y-adapter 2 toitmissüsteemi korraga ühendamiseks.

Ühekordseks kasutamiseks.

Vahetada iga 24 tunni järgselt.

Pakend

Pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.

Avamata ja terve pakend on steriilne.

30 tk. karbis

Toote ref.kood:

569915



Flocare® PEG Set - ENFit

PEG gastrostoomi sond ENFit otsikuga makku toitmiseks.
Flocare® perkutaanne endoskoopiline gastrostoomi (PEG) rajamise komplekt –“pull” meetodil endoskoobi abil paigaldatav gastrostoom.

Toote iseloomustus

- Paigaldamiseks ei ole vaja kasutada üldnarkoosi ega avada kõhuõõnt
- Valmistatud pehmest ja poolläbipaistvast polüuretaanist, mis tagab patsiendile mugava toidu manustamise
- Sondi röntgenkontrastsus võimaldab kontrollida sondi asukohta
- Hüdroomeerne kate ja jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust ja asukohta
- Väline silikoonist fikseerimisplaat on patsiendile mugav ja võimaldab naha hooldamist stoomi ümber
- Läbivoolu reguleerimisklamber, takistab toidu ja maosisu tagasivoolu
- ENFit otsik ühendamiseks toitmissüsteemiga

Kasutamisinäidustused

Flocare® PEG- i paigaldamine on näidustatud, kui patsienti on plaanis toita sondi kaudu pikemaajaliselt (üle 30 päeva). PEG-i kaudu toitmine on patsiendile mugavam ja põhjustab vähem komplikatsioone võrreldes nasogastraalsondi pikemaajalise kasutamisega.

Suurused

(väline diameeter/pikkus)

- Ch 10 / 40 cm
- Ch 14 / 40 cm
- Ch 18 / 40 cm

Pakend

Iga PEG on eraldi pakendis. Sisu on steriilne, kui pakend ei ole avatud või kahjustatud.

Toote ref.kood:

Ch 10: 94820

Ch 14: 594821

Ch 18: 594882

Komplekti osad

- ENFit otsik –
Ch 10 (must),
Ch 14 (roheline),
Ch 18 (punane)
- Läbipaistev röntgenkontrastne polüuretaansond, mis sobib Ch (10, 14 või 18) otsikuga. Sondi pikkus - 40 cm
- Sulgur
- Fikseerimisklamber
- Väline silikoonist fikseerimisplaat sondi fikseerimiseks kõhule
- Sisemine silikoonist fikseerimisplaat
- Ühekordne skalpell
- Punktsiooninõel
- Tamiil koos hoidikuga



Flocare® Bengmark PEG/J sond kasutamiseks koos Flocare® PEG CH 18-ga


Flocare® PEG/J sond koosneb Flocare® Bengmark PEJ CH9 polüüretaansondist.
See paigaldatakse endoskoopiliselt jejunumisse läbi PEG CH18 gastrostoomi.
Sondi distaalses otsas olev Bengmarki spiraal toimib ankrumehhanismina.
Sond on lateksi- ja DEHP-vaba.
PEG/J paigaldab ainult arst.

Pakend

1 blisterpakendis (CU),
3 karbis (TU),
steriliseerimine – ETO.

Toote ref.kood:

94823



Flocare® PEG otsik - ENFit

Flocare® PEG otsik – ENFit otsik turvaliseks ühendamiseks toitmisüsteemiga/süstlaga.
See on ette nähtud kasutamiseks juhul, kui muidu kasutamiskõlbliku PEG-I otsik on purunenud.

Saadaolevad surused

(väline diameeter)

- Ch 10
- Ch 14
- Ch 18

Pakend

Iga otsik on eraldi pakendis.
Sisu on steriilne, kui pakend ei ole avatud või kahjustatud.
Karbis on 10 tk.

Toote ref.kood:

Ch 10: 91397

Ch 14: 91395

Ch 18: 91396



Flocare® G-tube balloongastrostoom

Silikoonist ballooniga gastrostoomi sond enteraalseks toitmiseks makku. Paigaldatakse juba formeerunud gastrostoomikanalisse eelmise sondi asendamiseks või operatsiooni ajal. Balloongastrostoomi ühendamiseks soovitatakse kasutada Flocare® toitmissüsteeme.

Toote iseloomustus

- Valmistatud läbipaistvast silikoonist
- Paigaldamiseks ja asendamiseks ei ole vaja teostada endoskoopiat
- Sondi vahetus on võimalik ka kodustes tingimustes
- Jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust ja asukohta
- Makku jääva sondi osa on röntgenkontrastne
- Kaks lisaava sondi tipus aitavad vähendada ummistumist
- Väline silikoonist fikseerimisplaat on patsiendile mugav ja võimaldab hooldada nahka stoomi ümbruses
- Sondi välimises otsas on kaks porti: toitmiseks ja ballooni täitmiseks veega

Kasutamisinäidustused

Flocare® balloongastrostoomi paigaldamine on näidustatud, kui patsienti on plaanis toita sondi kaudu pikemaajaliselt (üle 30 päeva) või kui on vaja asendada PEG sond.

Suurused

(väline diameeter/pikkus/
ballooni maht)

- Ch 14 / 16 cm. Balloon - 5 ml
- Ch 18 / 16 cm. Balloon - 15 ml
- Ch 20 / 17 cm. Balloon - 15 ml

Pakend

Iga balloongastrostoomi sond on eraldi pakendis. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Toote ref.kood:


Ch 14: 178131

Ch 18: 178133

Ch 20: 178134

Balloongastrostoomi osad

- Port ballooni täitmiseks
- Port toidu manustamiseks (otsikust moodustub kork sondi sulgemiseks)
- Läbipaistev silikoonsond pikkusmõõtudega (cm). Sondi pikkus - 23 cm
- Väline silikoonist sondi fikseerimisplaat, mis võimaldab sondi fikseerida kõhule
- Silikoonballoon ja sisemine fiksaator, röntgenkontrastne
- Sulgur, mis takistab toidu ja maosisu tagasivoolu



Flocare® PUR toitmissond - ENFit

ENFit otsikuga polüuretaanist nasogastraalsond enteraalseks toitmiseks makku.

Ohutu, kerge paigaldada, peenike.

Vahetada 42 päeva/6 nädala järel.

Sond sobib kokku Flocare® enteraalsete toitmissüsteemidega.

Toote omadused

- Valmistatud pehmest, läbipaistvast polüuretaanist, mis on patsiendile mugav ja mis kohandub söögitoru kujuga
- Vajab vahetamist 6 nädala järel. Ka pikaajalisel kasutamisel ei muutu jäigaks
- Jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust
- Juhtetraat lihtsustab paigaldamist
- Röntgenkontrastne joon aitab kontrollida sondi asukohta
- Sondi tipus kaks külgmist lisaava, mis aitab vähendada ummistumist
- ENFit otsik ühendamiseks enteralse toitmissüsteemiga

Kasutamisinäidustused

Flocare® PUR sondi kasutatakse patsientide lühiajaliseks (kuni 6 nädalat) enteraalseks toitmiseks.

Suurused

(väline diameeter/pikkus)

- Ch 5 / 40 cm (ilma juhtetraadita)
- Ch 6 / 60 cm
- Ch 8 / 110 cm
- Ch 10 / 110 cm
- Ch 12 / 110 cm

110 cm pikkused sondid on täiskasvanute toitmiseks, 60 cm pikkune sond on imikutele ja lastele.

Pakend

Iga sond on pakendatud eraldi steriilsesse pakendisse. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne. Ühes karbis 10 sondi.

Toote ref.kood:

Ch 5: 94573

Ch 6: 94567


Ch 8: 94569

Ch 10: 94570

Ch 12: 94571

Sondi koostisosad

- A. ENFit, mis ühildub toitmissüsteemiga
- B. Läbipaistev polüuretaanist sond helesinise röntgenkontrastse triibuga ja cm mõõdestikuga
- C. Kaks külgmist ava sondi lõpuosas ja üks sondi tipus
- D. Silikooniga kaetud ümara otsaga juhtetraat



Flocare® pikendusliin, 100 cm

Pikendusliin (100 cm) on ette nähtud Flocare® toitmissüsteemi pikendamiseks. See annab patsiendile suurema liikuvuse ja lihtsustab hooldamist. Ohutu ühendada teiste ENFit süsteemidega.

Pikkus


- 100 cm

Pakend

Pikendusliin on pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne. Ühes karbis 40 pikendusliini.

Toote ref.kood:

91393



ENFit lahusekõrs, 100 mm

ENFit lahusekõrs vee, ravimite, muude enteraalselt manustatavate lahuste tõmbamiseks süstlasse

Suurused

- 100 mm

Pakend

Kõrs on pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.
Ühes karbis 30 kõrt.

Toote ref.kood:

119490



Madalaprofiilne balloongastrostoom (nööp)

Läbipaistev silikoonist madalaprofiilne balloongastrostoom.

Nahale jääv plaat on väga väike.

Paigaldatakse läbi juba moodustunud gastrostoomiava ja ei vaja korduvat endoskoopiat.

Fikseerimine seestpoolt ballooniga, mis täidetakse 5 ml steriilse veega.

Mugav hooldada ja puhastada nii stoomiava kui ka nööpi.

Kosmeetiliselt parim lahendus.

Paraneb patsiendi liikumisvabadus.

Mõõdud

- Ch 12 / 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm
- Ch 14 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 16 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 18 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm
- Ch 20 / 0,8 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 24 / 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 5,0 cm



Flocare® balloongastrostoomi pikendusliin (toitmissüsteem)

Flocare® pikendusliine kasutatakse nõõbi ohutuks ühendamiseks toitmissüsteemi/süstlaga ja toidu manustamiseks.

Suurused

- 30 cm
- 60 cm


Pakend

Pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.
5 tk. karbis

Toote ref.kood:

30 cm: 91398

60 cm: 142515



Flocare® ENFit enteraalsed toitmissüstlad

Enteraalsed toitmissüstlad ENFit otsikuga ravimite manustamiseks, toidu manustamiseks boolusena ja sondi loputamiseks veega. Süstal on ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil.

Suurused

- 1 ml – ravimite manustamiseks
- 3 ml – ravimite manustamiseks
- 10 ml – ravimite manustamiseks
- 20 ml – ravimite manustamiseks
- 60 ml – EISO-60
- 100 ml – EISO-100

Saadaval ka korduvkasutatavad toitmissüstlad kasutamiseks kodusel toitmisravi teenusel.

Pakend

Iga süstal on eraldi pakendis
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Toote ref.kood:

1 ml – ELDISO-1
3 ml – ELDISO-3
5 ml – EISO-5
10 ml – EISO-10
20 ml – EISO-20
60 ml – EISO-60
100 ml – EISO-100



Flocare® booluskonnektor

Flocare® booluskonnektor toidu süstlasse tõmbamiseks ohutult ja hügieeniliselt.

Pakend

Pakendatud ühe kaupa.

Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.

Toote ref.kood:

690390

